




4 720
DE CHOLERA.

DISSERTATIO
INAUGURALIS MEDICA
QUAM
PRO SUMMIS
MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS
RITE CAPESSENDIS
GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS
IN
ACADEMIA VIADRINA VRATISLAVIENSI
AUCTORITATE ET CONSENSU
DIE XV. JULII MDCCCXXXI.
H. L. Q. C.
PUBLICE DEFENDET
AUCTOR
MAURITIUS SCHLESINGER,
VRATISLAVIENSIS.

~~AL. L. Q. C.~~
Ju

VRATISLAVIAE,
TYPIS PHILIPPINIS.



VIRO

PROPINQUITATIS VINCULO CONJUNCTO
SIBI DILECTISSIMO MAGNOQUE

D. CASPAR

NEC NON

OTI EJUS ORNATISSIMAE SIBI
AMICISSIMAE FAMILIAE.

HASCE

SUORUM STUDIORUM PRIMITIA

PIO GRATOQUE ANIMO

D. D. D.

AUCTOR

PROOEMIUM.

Prooemium plerumque ad benevolentiae
coris captationem scriptum est. Propo-
n igitur, hoc etiam a me factum esse,
praeterea addo, me veritatem nullo
vitae tempore laesuram atque punc-
tum esse. Quam ob rem omnia, quae de
his in hoc libello a me factis, dicentur
melio rem meam eruditionem, libentis-
accipiam.

Denique si minimam partem aliis a
meliorem morbi descriptionem adjicere pos
sem, consilium meum in hoc libello assecu
tum est.

LITERATURA.

Non alienum hic esse puto, si primum li-
 de morbis tropicis, ad quos cholera pertinet,
 ro, quoniam in his libris multa ad choleram
 noscendam tradita sunt:

BONTIUS, de medicina Indorum. Lugd. Bat.
 1642. 1718.

ING, essay on the diseases incidental to Euro-
 peans in hot climates with the method of pre-
 venting their fatal consequences. London. 1768.

1771. 1777. 1778. 1808. — Uebers. »Versuch
 über die Krankheiten, denen Europäer in heis-
 sen Klimaten unterworfen sind.« Riga und Leip-
 zig 1773.

L. HILLARY, on the climate and diseases of
 Barbados etc. Lond. 1759. — Von den hitzigen
 und langwierigen Krankheiten auf den westindi-
 schen Inseln. Leipzig 1776.

ROBERTSON, a physical Journal Kept during
 three voyages on the coast of Africa and West-
 Indies in the years 1772—1774. Lond. 1779. 4.

MALES CURTIS, an account on the diseases of In-
 dia as they appeared in the english fleet and

naval hospital at Madras in 1772—83 etc. Edin
1807.

J. CLARKE, observations on the diseases which
prévail in long voyages to hot countries par-
ticularly on those in the East-Indies etc. 2 Vols.
Lond. 1773. 1792. 1809. — Uebers. Leipz. 1777.

D'AZILLE, observations generales sur les maladies
des climats chauds. Paris 1785.

G. CLEGBORN, Beobacht. über die epidem. Kran-
heiten, w. 1744—49 in Amerika geherrscht
Aus dem Engl. übers. v. Ackermann.

NIC. FONTANA, osservazioni intorno alle malattie
che attaccano gli Europei ne' climi caldi. Im-
presso 1781. 8. — Des maladies, qui attaque
les Europeens dans les pays chauds, trad.
l'italien par Venissant, revu par Kera-
dren. Paris 1818.

BENJ. MOSELEY, a treatise on tropical diseases,
military operations and on the climate of the
West-Indies. Lond. 1787. — Uebers. »Von den
Krankheiten zwischen den Wendezirkeln und
von dem Klima in West-Indien.« Nürnberg 1790.

ROB. THOMAS, medical advice to the inhabitants
of warm climates. Lond. 1790.

JOHN HUNTER, Observations on the diseases of the
army in Jamaica and on the best means of pre-
serving the health of Europeans in that climate
Lond. 1796.

P. WADE, on the prevention and treatment of the
disorders of seamen and soldiers in Bengal
London 1793.

WILL. HUNTER, an essay incident to seamen or
 sailors in long voyages. Calcutta 1804. fol.

R. GILB. BLANE, observat on the diseases of
 seamen. 3. ed. Lond. 1803.

CAMPET, traité pratique des maladies graves,
 qui regnent dans les contrées situées sous la
 zone torride et dans le midi de l'Europe. Pa-
 ris 1802.

KECE, the medical guide for tropical climates:
 Lond. 1814.

IMPSON, exposition of Elementary principles spe-
 cially concerned in the preservation of healthi-
 ness and production of distempers amongst ma-
 riners, travellers etc. in tropical climates etc.
 Lond. 1820.

M. BOYLE, letters on the prevention and cure
 of diseases peeculiar to hot climates etc. Lond.
 1823.

LIN CHISHOLM, a manual of the climate and di-
 seases of tropical countries etc. Lond. 1822.

MES JOHNSON, the influence of tropical clima-
 tes on european constitution etc. Lond. 1811.
 21. 27.

JOHNSON, an essay on morbid sensibility of the
 stomach etc. to which are added observations
 on the diseases of warm climates. Cheltenham
 1825.

ES ANNESLEY, Researches into the causes, na-
 ture and treatment of the more prevalent di-
 seases of India and of warm climates generally;
 illustrated with cases, post mortem examinatio-

nis and numerons coloured engravings of morbid structure; in two volumes. Lond. 1828. 4.

HIPPOCRATES, Epidem. lib. V. pop. — De victu acut. LXI. — Aphor. III. XXI. Popul. V. 27. Pop. VII. 40.

Aretaeus, de morb. acut.

OPERA Tralliani (VII) Aetii, Coel. Aureliani (de morb. acut.), Celsi (lib. IV. cap. XI.); Pisonis, Sennerti, Riverii, Ettmulleri, Hoffmanni, Vateri, Teichmeyeri.

TH. SYDENHAMI, opuscula univ. Lipsiae 1711.

MORTON, pyretologia.

JODOC. LOMMII, observationes medicin. lib. III. Jenae.

C. G. LUDWIG, instit. medic. clin.

DON CARLOS JOSEF ZAPATA, disertacion theoricopractica de la cholera en su estado natural y morbosos manifestando los perpicios, que puede causar consus alterationis en la humana maquina, modo de conocerlos y corregirlos. (Memor. Acad. de la R. Societ, de Sevilla).

TH. SYDENHAMI (Filii), observation sur un cholera morbus (Sedillot Rec. Period. de la Societ. de Medec. de Paris. T. 22. p. 419).

L. M. CALDANI, memoria intorno ad una specie singolare di quella malattia che si chiama cholera morbus o semplicemente cholera (Mem. della Soc. Italiana Th. 12).

IGNIER, observation sur un cholera-morbus et rapport de Delaporte sur cette observation (Bullet. de l'ecole de Medec. et de la Societ. de Paris 1807).

IZION, faits de medicine (fièvre puerperale compliquées de fièvre scarlatine avec cholera morbus dans son debut) (Ann. de la Societ. de Medec. de Montpellier T. 17).

G. HOYER, de hemiplexia cum aponia et totali omnium rerum oblivione a cholera tridua feliciter curata (Ephemerid. Acad. Natur. Curios. Cent. 3 et 4).

ANT. DOUGLAS, of the cure of the cholera. Med. essays and Observat. by a Soc. in Edinburgh. Vol. 5. p. 2).

MATTEY, observation sur le cholera morbus, privation absolue de tout liquide et considerations generales sur l'abus des remèdes. (Annales de la Soc. de Med. de Montpellier. T. 24).

LEREUX, observations de cholera morbus ouousse-galant et indication d'une potion, qu'on peut regarder comme specifique dans le traitement de cette maladie. (Sedillot Rec. Period. de la Societ. de Med. de Paris).

CHRESTIEN, observations sur l'emploi de la glace et des glaces, dans quelques cas particuliers des maladies (de l'emploi des glaces dans le cholera-morbus). Annales de la Societ. de Med. Montpellier. T. 2.

AASHOW, de salubri effectu vesicatorii ab-

domini applicati in cholera ab acri orta observatio. (Acta Joc. Med. Hanniens. V. 1).

De cholera defuncti anatome (ob suspicionem veneni). Miscell. Acad. Nat. Curios. Dec. A. 7. et 2. 1699 et 1700).

H. HENRICI et J. F. MESSER, de cholera morbo Hal. 1710.

J. G. BRENDDEL, de cholera morbo. Götting. 1747.

B. L. TRALLES, histor. cholerae atrocissimae, quam sustinuit ipse persanavit aegerrime. Vratislav 1753. 8.

W. CURRIE, treatise on the cholera. Philad. 1790.

METFORD, de cholera. Edinb. 1777.

LEMANN, de cholera. Edinb. 1778.

LYONS, de cholera. Edinb. 1785.

LAUR. PHILIPSON, dissert de cholera. Lundin. 1791. 4.

HARKAN, de cholera. Edinb. 1801.

J. S. SENGENSEE, diss. sur le cholera. Paris 1803.

M. ESMENARD, diss. sur le cholera. Paris 1808.

J. J. BORY, diss. de cholera. Paris 1808.

M. TALLMANN, de cholera (in Eyerel dissertas med. Vindob. ad morb. chron. pertin. etc. Vol. II Vienn. 1789. p. 240. 99).

Reports on the epidemic cholera which has raged throughout Hindostan and the peninsula of India since August 1817, published under the Authority of the Bombay Government. Vol. I. 4to Bombay 1819.

J. JAMESON, report on the epidemic cholera morbus, as it visited the territories subject to the presidency of Bengal in the year 1817, 1818.

1819 drawn up by order of the Government under the superintendence of the medical Board. Vol. I. 8vo. Calcutta 1820. p. 325.

GINALD ORTON, essay on the epid. chol. of India Madras 1820. T. 2.

WILE, treatise on the epid. cholera of India. Lond. 1821.

WILL. SCOTT, report of the epidemic cholera as it has appeared in the territories subject to the presidency of Fort St. George etc. Madras 1824. 4to. p. 350.

W. F. KERAUDREN, de cholera morbus de l'Inde ou Mordechi. Paris 1824.

W. H. AINSLIE, observations on the cholera morbus of India. Lond. 1825.

W. ANNESLEY, Sketches of the most prevalent diseases of India: comprising a treatise on the epidemic cholera of the east, statistical. and topographical reports of the diseases in the different divisions of the army under the Madras presidency, embracing also the annual rate of mortality etc., of european troops etc. illustrated by tables and plates. Lond. 1825.

W. H. KENNEDY, (surg. Bombay presidency) notes on the epidem. cholera. Calcutta 1827. 8vo.

W. TURNB. CHRISTIE, (M. D., Madras medic. etiacl. etc.) observations on the nature and treatment of cholera and on the pathology of mucous membranes. Edinb. 1828. 8vo.

W. RANKEN, observ. on the epidem. cholera morbus of the East-Indies. (Edinb. med. and. surg. Journ. 17. 19. p. 501).

W. ROBSON, history of the epidem. cholera, as it appeared on board H. M. Ship Malabar on its passage from Bombay to the equator 1819 (Edinb. med. and surg. Journ. V. 19. p. 501.)

Account of the spasmodic cholera, which has lately prevailed in India and other adjacent countries and Islands etc. in a letter from Mr. Carbyn to Sir Gilbert Blane medic. chir. transact. Vol. XI. p. I. 1820.

On the occurrence in Persia of the epidem. cholera of India etc. (med. chir. transact. of Ld. Vol. II. 1823)

Dr. REHMANN, die Ankunft der orientalischen Cholera am mittelländischen und kaspischen Meere. (Hufelands Journ. der prakt. Heilkunde. Juni und Septemb. 1824), et Progress of the cholera morbus from Indier to the mediterranean and caspian seas (in Edinb. med. and. surg. Jour. V. 23).

Dr. REHMANN, Nachrichten über die indische Brechruhr in der Mongoley. (Magaz. der ausländ. Literatur. von Gerson und Julius. Bd, 15).

MOREAU de JONNES, über Cholera (Analyse des travaux de l'academie royale des sciences pendant l'année 1824, partie physique. p. 77.

MOREAU de JONNES, rapport au Conseil superieur de santé sur la maladie pestilentielle, designée sous le nom de Cholera-Morbus de l'Inde et de Syrie. Paris 1824. 4.

J. ADAM, on cholera morbus (London. med. and physical. Journ. Bd. 48.

Dr. KARL MEIER, die morgenländische Brechruhr innerhalb Russlands Grenzen. (Magaz. der aus.

änd. Literatur von Julius u. Gerson. Bd. 7) et
 letter to the chairman and deputy charman of
 the East Indies from Sir G. Blane, (Edinb.
 med. and. surg Journ. Juli 1825).

-cholera, more especially as it has occurred
 during the late years in British India, a letter
 addressed to Sir J. M'Grigor etc. by Thom.
 Brown. Edinb. 1824. (Edinb. med. and. surg.
 Journ. July 1825).

MAILLE (Journ. universel des sciences medicales
 Janvier 1825).

LIVINGSTONE, on epidem. cholera as it appea-
 red in China. (Transaction of the medie and.
 phys. society of Calcutta. Vol. I. Calcutta 1825.
 RÜGGREN, Königl. schwedischer Gesandtschaftspre-
 diger zu Constantinopel, in einem Briefe über
 Cholera (im Almänna-Journ. 1824. Asiatic Journ.
 Bd. 13. 14. 15. und 16).

son, über die Brechruhr auf Amboina (Ferus-
 ae Bulletin des sciences medicales. Bd. 7), aus
 en im October 1823 auf Amboina vom Wund-
 rzte Lesson während der Duperreyschen Ent-
 deckungsreise niedergeschriebenen Bemerkungen,
 auch im Magaz. der ausländ. Literatur. Bd. 15.
 WELL, über die Brechruhr, wie sie in Indien
 beobachtet worden ist. (Archives generales de
 medicine. Bd. 6 et Magaz. der ausländ. Literat.
 . Gerson u. Julius. Bd. 15).

AVIER, über die Brechruhr. (Broussais Annales
 de la medicine physiologique Bd. II.). Magaz. d.
 ausländ. Lit. v. Gers. u. Julius. Bd. 15).

JOHN CORMICK, on the occurrence in Persia of the epidemic cholera of India. (medico-chirurgica transactions of London. Vol. 12).

Transactions, of the medical and physieas society of Caleutta. Vol. I. No. 22.

Observations on the epidemic cholera as it appeared in China by Livingstone. Vol. III. Append. No. 82. 83.

Voyage medical autour du monde executé sur la Corvette du Roi etc., par R. P. Lesson. Paris 1829.

WILLIAM CULLEN, Anfangsgr. der prakt. Arzneykunst. 3r Bd. 2te Ausg.

Jos. LIEUTAUD, Inbegr. der ganzen medic. Praxis, 3 Thl.

C. A. W. BERENDS, Vorles. über prakt. Arzneywissenschaft., herausgeg. von D. C. Sundelin. 4 Bd. S. 325.

FRÄSER (James B.), Reisen u. Abentheuer in den persischen Provinzen an dem kaspischen See. Jena 1826.

The American. med. Recorder conducted by several respectable Physicians of Philadelphia. Vol. II.

MASON GOOD, study of Medicine. Vol. I.

DEGUIGNES, histoire generale des Huns. Tom. II. Reports of Dr. Burrel and Mr. Whyte. (Med. chir. Transactions, Vol. XII.)

DELLONIUS, voyage aux Indes orientales.

FIZCLARENCE'S Reise aus dem brittischen Lager durch Indien und Egypten nach England in den Jahren 1817 u. 18. Jena 1820.

DOUGLAS, on cholera morbus in his Majesty's 14th. Regt Berhampore (Transactions of the medical and physical society of Calcutta. Vol. IV. Calcutta 1829.

CHARLES SEARLE, cholera its nature, cause and treatment; with original views physiological pathological and therapeutical in relation to fever, the action of poisons on the system. Lond. 1830.

A. W. H. HENSCHEL, gelegentliche Erwähnung einiger indischen Volksarzneimittel gegen die Cholera. (Rust's Magaz. f. die gesammte Heilkunde. Vol. 33. S. III. 1831).

Wichtiger Schattenriss der sogen. Cholera Indica, wie sie 1830 in der östl. Hälfte des europäischen Russlands epidemisch herrschte, v. Dr. Blumenenthal. (Rust's Magaz. für d. gesammte Heilkunde. Vol. 33. S. III.)

RATHKE, über die Cholera. (Rust's-Mag. für d. ges. Heilkunde. V. 33. S. III).

TILESUS v. T., über die Cholera u. die kräftigsten Mittel dagegen, nebst Vorschlag eines grossen Ableitungsmittels, um die Krankheit in d. Geburt zu ersticken. Nürnberg 1830.

J. A. SCHUBERT, Heilung und Verhütung der Cholera morbus. Leipzig 1830.

FR. SCHUBERT, die Cholera morbus, ihre Verbreitung, ihre Zufälle, die versuchte Heilmethode, ihre Eigenthümlichkeit und die im Grossen dagegen anzuwendenden Mittel. Mit d. Charte ihres Verbreitungsbezirks. Stuttg. u. Tüb. 1831.

- Dr. FR. G. GMELIN, die ostindische Cholera, aus dem Engl. des John Mason Good übers. u. mit einigen Zusätzen. Tübingen 1831.
- Dr. A. RIECKE, Mittheilungen über die morgenländische Brechruhr. 1te Bd. Stuttgart. 1831.
- Dr. LICHTENSTÄDT, die asiatische Cholera in d. Jahren 1829 und 30, nach russ. amtlichen Quellen bearbeitet, nebst einer Karte. Berlin 1831.
- Dr. LICHTENSTÄDT, die asiatische Cholera in d. Jahren 1830 und 31, nach russ. Aktenstücken und Berichten. Erste Lieferung. Berlin 1831.
- Dr. E. J. H. ELSNER, über die Cholera, nebst Versuch, dieselbe zu heilen. Leipzig 1831.
- Ueber die ostindische Cholera, nebst vielen eigenen Beobachtungen etc. etc., von James Annesley, aus dem Engl. übers. von Dr. Gustav Himly. Hannover 1831.
- Die Cholera morbus, oder kurze Geschichte des Ursprungs und Verlaufs der indischen epidemischen Brechruhr, wie sie seit 1817 geherrscht hat etc. etc., von einem prakt. Arzte. Leipz. 1831.
- Dr. CH. FR. HARLESS, über die Cholera Indiens u. Russlands, ihren wahren Charakter, über die bei ihr wesentlich eintretende Art des Darmleidens etc. etc. Braunschweig 1831.
- Dr. MORITZ HASPER, über die Natur und Behandlung der Krankheiten der Tropenländer etc. etc. Vol. II. Leipz. 1831.
- Dr. WOLDEMAR NISSEN, über die Ursachen d. Cholera, nebst Vorschlägen zur Bekämpfung derselben. Altona 1831.
-

NOVISSIMA CHOLETA HISTORIA INDE TEMPORIBUS ANTIQUISSIMIS USQUE AD TEMPORA NOVISSIMA *).

ique morbi per saecula plura jam noti pro-
non semper omni tempore eadem sympto-
prae se tulerunt, sed e mutata hominum con-
itione, e mutationibus in aere terraque et om-
continuo pariente natura, quae non semper
in eadem forma gignit, mutati sunt et alia
tea symptomata mox maligniora, mox benigna
ostenderunt. Nihilominus autem morbi iidem
ter has mutationes nec novi habiti sunt, nec
nominati. Quam ob rem cholera novissi-
temporibus saevientem multo quidem dis-
am esse ab antiquorum temporum cholera, mi-
vero novum morbum esse existimandum con-
—. Dummodo symptomata hujus morbi
characteristica observamus, plures medicos Graeco-
cholera significasse cognoscemus. Hoc au-

Riecke, Schnurrer, Gmelin, Elsner, Hasper cholerae
historiam multo perfectius et accuratius tractaverunt,

tem ea de causa interdum merito dubitatur, quod nonnulli veteres medici choleram aliis morbis ventriculi intestinorumque abdominis permiscuisse viderentur, (hoc etiam praesente tempore interdum accidit) ideoque eorum significatio cholerae obscura. Antiquissimis enim temporibus medici a cholera animam non intenderunt, quum huius morbus raro et sporadice appareret.

Scripta Hindorum nihil de cholerae epidemiae sed de maligna sporadica cholera continent. LIVINGSTONES contendit, choleram antiquissimam temporibus, Hippocratis tempore, sub nomine Cholawn descriptam esse, ibique ipsam malignissimam morbi formam notam fuisse (mortis cholerae). In opere, Dhanwantari dedito, cholerae similis morbus indicatur. Apud alios sub uno verso nomine Ajirna (dyspepsia) et Vidhumar, Vischuchi noster morbus commemoratur. BONTIUS quoque cholerae mentionem facit. Utrum morbus annis 1030, 1374, 1387 in India vastam cholera fuisset, nec ne, dubium est. Hoc autem confirmari potest, choleram in Europa jam nonnumquam adfuisse, quae partim ita maligna fuit ut singuli aegroti intra 24 horas sint mortui. SYDENHAM duas epidemias huiusmodi descripsit quae annis 1669 et 1676 Londini sese ostenderunt. Medio decimi septimi saeculi DELLONIUS (l. c.) medicus Gallicus, de cholera, quam in India Orientali observare potuit, scripsit. Qui morbum tum temporis in regione fluminis Gangis substitit usque ad praesens saeculum, quo terribilem morbum

ordinem manifestavit. Medici alii, qui choleram servaverunt, sunt: Paisley 1774 in Madras; annerat 1774—81 in Arcot et Vallore, ibique m Thomsons 1787. Cholera porro obser- ar 1788 in insula, Mauritio, 1781 in Ganjam; 81 et 82 in Madras; 1769 et 70 in Puliconda, Amborthal; 1783 in Amborthal; 1787 in Yel- (Dr. Duffin); 1787 in Arcot (Dr. Davis Thomson); 1790 in Trincomale (Thom-); 1804 in vicina regione a Trincomale ohnson); 1814 in Jaulnah (Willie et uikshank.)

Primum vestigium hujus magnae epidemiae paruit anno 1817 et mense quidem Augusto in e Jessore, mense Septembri Calcuttae et Nel- erupit cholera. Inde intra 15 menses urbes pur, Aurungabad, Aumenadgur, Punah, Bom- et totam igitur peninsulam Indiae-Orientalis ue ad ripas sinus Arabici invasit. — Anno 8 in urbibus Allahabad, Delhy simulque Ma- s, Pondichery, Carnat, Bellary cholera apparuit.

Navigazione cholera jam primo anno suae erup- nis in plerasque insulas Oceani Indici translata et annis 1818 et 19 venit jam in insulas Cey- , (Isle de France), Mauritium; tum in insulis Ma- ca, Java, Celebes et Amboina (1823) animad- titur simulque in insulis Philippiniciis.

Trans peninsulam cholera quoque saevisse di- ur. 1820 apparuit cholera in urbe Bankok et ton; 1821 in urbe Peking, murum urbis Chi- transiit et usque ad urbem Kuku-choton pro-

gressa est (1826); sed quo magis morbus ad orientem venit, eo magis narrationes incertae sunt.

Postquam per quinque annos multas Indiae Orientalis urbes invasisset, versus occidentem se contulit. Primum apparuit anno 1821 in sinu Persici ripis, simulque in urbibus Surate, Muscate, Benden-Abbassi, Bassora et secunda vice in urbe Bombay.

Morbus nunc in duas diversas regiones vertitur: In prima via se contulit a Bassora secundum flumina Tigrem et Euphratem, et videtur anni 1821 et 22 in urbibus Bagdad, Mosul, Mardin, Diarbekir, Biri, Orfa, Alintab et Aleppo. Inde morbus in ripas maris mediterranei diffunditur; dum cholera in urbe Bagdad fuit.

In secunda via cholera ab urbe Bender-Abbassi contendit in Schiraz 1821; tunc urbs Jeshmense Septembri invaditur, lente progreditur (1822) in urbes Nai Kashan, Koom, Kosbrun, Sava, Dain, Killat, Nargan, Caspin, Ebner, Sultanieh, Senghan, Mianeh et Tauris. Inde aggrediuntur Ardehil, Rascht et Babfrusch, urbes in ripa Maris Caspii, et mense Majo 1823 cholera erupit in provincia Schirwan et apparuit mense Septembri ejusdem anni in urbe Astrachan.

Sequentibus annis in Russia lente progreditur, apparuit anno 1829 mense Septembri in Orenburg et vicinis regionibus. Anno 1830 in regiones fluminum Wolgae, Kuris, Donis venit et mense Oc-

ri ejusdem anni etiam urbem Moscoviam cholera aggressa est *).

Haec cholera epidemica in suo cursu omnibus temporibus et apud maxime varios caloris gradus saeviebat, non solum in humidis et male locis sed etiam in regionibus montuosis et locis vastis et disertis apparuit. Quam ob rem etiam alias adhuc terras, quod autem porro Deus omnipotens prohibeat, minari potest.

Jamjam in Polónia et quidem etiam Varsoviae cholera, verosimiliter bello transducta, eruitur et latius adhuc in vicinas regiones diffundi dicitur. De hac re autem nondum narrare possum:

DE NOMINE ET DERIVATIONE VERBI CHOLERA.

Cholera; Cholera-morbus; Chôlirica; cholerragia; cholericæ passio; Passio felliflua. — — Græcæ. — — Germ: Gallenkränkheit; Gallenruhr; Gallenfluss; Gallensucht; Brechkolik; Brechdurchfall; Brechruhr. — — Gall: Trousse-gàlant; mal de terre; mort de chien. — — Angl: Cholera; Cholera-flux; Balious-flux. — — Ital: Cholera; Cholera-collera. — — Belg: Bort; Boorts; Gal-

*) Pleraque urbium insularumque nomina contra grammaticæ regulas consulto immutata ad meliorem cognitionem tenui, quod excusare peto.

ziekte; Galbraking; Braakziekte. — — Dan: Gal-
desot; Galdesygdom. — — Suec: Gallsjuka. — —
Island: Gallbusua. — — Hisp: Cholera. — —
Lusit: Colera; Colirica. — — Persic: Weleb. — —
Arabic: El Houwah. — Sanscrit. et Hindost: Swé-
tanasa, Seetrūs; Murghee; Vishuchi; Stanga; Van-
die; Ennerum. Olautha (ab ola descendere et utha
ascendere) Morghi, Morschi (unde Mordezym, Mor-
deschim; Mordyxim, mort de chien). — —

Quod attinet nominis cholerae derivationem
medici non inter se consentiunt. Alii et plerique
quidem veteres dicunt, choleram nominatam esse
a fluore fellis ex ore atque ventre (indē a *χολή*
(fel) et *ῥέω* (fluo); alii a multitudine fluentium
humorum, qui sunt felli similes. Non enim, in-
quunt, esse fel, sed esse liquida in colorem felli
similem transeuntia. Ex hac explicatione elucet
verbum »cholera« adjective (*χολερὸς, α ον*) esse
dictum, et substantivum-morbum (*τὴν νόσον*) esse
supplendum. — Alii tamen credunt cholera no-
men ducendum esse e *χολερά* (canalis, qui excipit
e tegulis aquam coelestem Dachrinne) et adjectato
substantivo »morbus« non propriam sed assumptam
significationem substantivi »χολερά« declaratam esse.

Confiteor, me ad explicationem primam et
secundam inclinare, nihilominus autem hunc mor-
bum »cholera morbum« nominarem, quoniam
substantivum »cholera« solummodo ad hujus morbi
significationem satisfaciat, et quisque praesente
tempore sciat, qualis morbus sub cholera intelli-
gendus sit. —

Ad accuratius praesentem cholera distinguen-
 a, ab antiqua priorum temporum, adjectiva
 siatica « seu » Indica « probanda sunt.

DE CONTAGIO CHOLERAE.

Semper hucusque medici inter se dissentiunt,
 um cholera contagiosa an non contagiosa sit,
 que autem jure contendunt, hunc morbum
 contagiosum. Numerosa exempla tristia me-
 rum experientiam in hac ratione tutiorem fe-
 unt. Permulta enim exempla arguunt, chole-
 cum malorum contagiosorum caractere cru-
 se, idemque morbi hujus cursus, qui fere sem-
 llente et gradatim procedit, docet, ita ut sin-
 res casus, qui contagium non ostenderunt, pro-
 non contrarium probare possint. Sine dubio
 era praesente tempore a causis singularibus,
 medici morbificis viribus vel variis climatis
 tionibus explicare studuerunt, originem suam
 t.

Quum vero cholera, quamquam sententia pro
 contagio magis magisque intelligitur et con-
 tur, pervario modo diffunditur, ea de causa
 er adhuc incerti sumus de contagii genere.

Quaeritur nunc igitur, utrum cholera sit con-
 sa, an miasmatica, an simul contagiosa et mi-
 tica.

Decurrente cholera contagium oriri videtur,
 vis et amplitudo celerrime et magnopere

accrescit, quo cholera in locos distantes propagatur et diffunditur. Non solum diffusio cholerae epidemicae sed potius progréssus et abitus hujus morbi ab uno loco ad alterum, plerumque secundum magnorum fluminum cursum, ad commercia, simulque quod cholera in locis et anni temporibus apparet et perdurat, in quibus nullae causae existunt, quae ejus primae procreationi favereant, contagium probat.

Si recte contendatur, ventus nec cholerae cursum impedire nec accelerare, imo etiam cholera interdum in directione plane ventui contraria diffundi, tunc hac sententia contagii argumentum maximi momenti est datum. In hoc casu enim fixa materia, quae aeri non communicari potest, morbum propagat et nil aliud esse videtur nisi contagiosa materia. Quae vero sententia non in omnibus casibus recte est existimanda.

Sunt autem adhuc aliae causae, quae morbum contagium probant et affirmant. — Cholera in multis locis non apparuit, qui iis vicini erant, ubi morbus regnavit, et quidem ea de causa non apparuit, quod aut homines cholera laborantes illi non venerunt, aut cautionibus diligentibus contagium ab illis locis impeditum est. Quum autem homines ad se tuendos locum, quem cholera regnavit, reliquerunt, tunc saepe contagium sine morbo signo jam secum tulerunt, ita ut aus ipsi aut alii in hunc morbum inciderent et tali ratione choleram diffuderunt.

Si nonnulli contagium ea de causa esse ne-
 t, quod ex eorum sententia contagium apud
 saepe frequentem morbi decursum non for-
 ri possit, profecto non verum contenderunt.
 er omnes enim constat, tempus ad contagium
 ereandum nunquam accurate constitui posse.

Si alii choleram non morbum contagiosum
 ant, quod multi homines contagio expositi et
 hoc morbo per longum tempus occupati, at-
 en non inficiebantur, tunc haec sententia nihil
 d demonstrat, nisi omnes homines ad conta-
 n accipiendum non dispositos esse, quod autem
 d omnes morbos contagiosos observari solet.
 altera vero parte certae observationes adsunt,
 e iterum demonstrant, choleram hominum so-
 ate magnopere divulgatam esse, et ex obser-
 one jam supra commemorata, morbum secun-
 a fluminum cursum et secundum magnarum com-
 cii viarum directionem concludi potest, conta-
 n per homines communicari. — —

E nova et meliori explicatione contagium ha-
 ir semen organicum vivum, quod sicut omnia
 semina organica e quodam formationis sche-
 e ad singulare vitae formaeque genus excoli-
 , et non solum propagandi sed etiam se multi-
 andi aut augendi facultatem habet. Si hanc
 licationem teneamus, sententiam contra conta-
 n faciliter confutari potest eorum, qui ex oty-
 ogia verbi »contagii« a contactu, contendunt,
 uines, quamquam alios cholera laborantes teti-
 ent, attamen ab hoc morbo liberos manuisse.

Alio igitur nullo modo nisi aegrotorum contactu cholera communicari potest? Nonne credere possumus, contagium etiam corpus humanum circumdare, propinquum aëra complere, ita quidem, ut morbus ipsa hujus aëris vi non autem contactu aegroti in alios homines transferri possit.

Si morbus quidam ab aëre aut solo originem ducit, ideoque miasmaticus est, tunc multi uno eodemque tempore corripuntur; si vero morbus naturae est contagiosae, homines sensim sensimque invaduntur (quod cholera epidemica hodierno tempore divulgata ostendit), quoniam certum temporis spatium praeterlabi opus est, priusquam contagium ex uno homine ad alium transfertur.

Pathologia docet, miasma in contagium nec autem contagium in miasma converti potest. Experientia vero ostendit, choleram in sua patria primum mere miasmatica ratione ortam esse, postero tempore naturam contagiosam accepisse, dum autem morbus characterem miasmaticam non amisit. Quam ob rem natura hujus cholerae epidemicae contagiosa, propter ejus symptomata varia et singularia, propii generis a multis medicis existimatur. — Ex his omnibus conjecturam facio, miasma primitivum, quod evomitis et alvi dejectis materiis et aliis corporis secretis exhalationibusque fortasse conservatum erat, cum contagio ad quoddam contagiosum principium, cui nomen contagium miasmaticum tribuere mihi licerem, se conjungere potuisse, quod ad alios se diffundere vim haberet. Tunc non dubium esset, quin huic

contagio miasmatico facultas inesset, qua ad
 erias et praecipue ad lanam vel ad res laneas
 solum adhaerescere, sed etiam in iisdem re-
 inhaerere possit, tali modo propagetur, et ad
 asferendum morbum in locos remotos det oc-
 onem. Omnino autem non oppugnandum est,
 lerae contagium proprii generis esse debere,
 am saepe in iis locis non erumpit, ubi omnes
 sae eam expectandi adsunt, dum iterum illic
 aret, ubi eam minime timendam esse credi-
 unt. —

Nonnulli credunt, contagium non solum in
 e aegrotum circumdante esse, sed etiam ato-
 hujus contagii satis fugaces esse, ut aëre in
 as directiones longissime diffundi possint et
 hominibus ad hunc morbum dispositis vel in-
 ando vel etiam cute vel alio modo communi-
 . Quae sententia ea de eausa falsa est existi-
 da, quod tunc contagio extensio in aër infi-
 tribuitur. Inter omnes autem satis constat,
 agium cum aëre universo conjunctum sensim
 imque vim suam amittere, et denique neu-
 partem sequi. Sed ex alia ratione illa falsa
 entia, si affirmaretur, etiam periculosa esset,
 nam omnes illae salubres et utiles provisiones
 orbum impediendum negligenterentur. Contagium
 tum commercio et consuetudine non impe-
 cum sanis hominibus ad validos transfertur,
 autem, hoc impedito, contagium longiori
 agatione carens de novo non oriri potest
 que exstinguitur.

Experientia denique doced, quod autem antiquissimo tempore durantibus magnis pestibus jam observatum est, animalia, regnante cholera in morbos quosdam incidisse, exempli causa pecora corunta, camelos, elephantos, canes, simias, grues, gallinas etc. — Utrum hoc contagio aut miasmati aut utrique tribuendum sit, nescio. —

DE NATURA CHOLERAE.

Non minus difficile est judicatum, quae cholerae natura sit. Quis dubitet, quin sedes hujus morbi in digestionis organis sit et praecipue in ventriculo et intestinis, quod insolitis et vehementibus sursum deorsumque secretionibus certe affirmari potest. Sed haec symptomata morbosa canalisi alimentarii, non primam hujus morbi causam tradunt, sed signa mutationum in systemate sanguifero et nervoso praecipue sunt existimanda. —

Morbum hunc esse intestinorum inflammationem nullo modo accipi potest. Si etiam intestinorum inflammatio quibusdam symptomatibus cholerae similis est, attamen decursus et cetera symptomata amborum morborum magnopere inter se dissentiunt. Ad affirmandum choleram non esse intestinorum inflammationem haec sunt argumenta: Omnis magna inflammatio cum symptomatibus febrilibus incipit, hoc autem raro in cholera observatur. Apud inflammationem dolores saepissimi tanti sunt, ut levissimus digitorum tactus non sus-

ri possit, quod vero in cholera non solam ani-
 advertitur, sed etiam e contrario frictiones for-
 et assiduae maxima utilitate sunt. Tumor, ar-
 , secretionum interruptio, propria igitur inflam-
 -ioni symptomata, in cholera aut omnino aut ple-
 -que absunt; ex alia parte autem cholerae alvi
 -ectiones aquosae explicationi inflammationis con-
 -licunt. — Maximam quidem sitim in cholera
 -roti accusant, attamen lingua nec siccitatem
 -calorem ostendit, sed potius interdum frigesc-
 -e solet. — Multi e cadaverum sectione inflam-
 -ationem demonstrare volunt, sed eorum argu-
 -nta non hanc rem probantia et satisfaciencia sunt.
 -ae inflammationis signa saepe habebantur nil
 -signa congestionis magnae fuerunt, et profecto
 -pe difficillime est, veram inflammationem a
 -ltis similibus signis congestionis plane discer-
 -e. — Multi narrant, intestina inflammata se re-
 -isse, nihil autem dixerunt de textura intestino-
 -a et cutium rubefactarum (qui color ruber non
 -s erat, qualis apud veras inflammationes ani-
 -advertitur), ex quo solummodo judicari posset,
 -um inflammatio, an congestio an gangraena, an
 -usa mechanica, remediis orta, adfuisset. — Alii
 -hominibus, hoc morbo brevissimo tempore mor-
 -s, inflammationem vidisse voluerunt. Sed in-
 -nmatio in nonnullis horis non perfecte excoli
 -test, dum eodem tempore congestio magna co-
 -iter oriri valet. — Remedia antiphlogistica,
 -xempli causa calomelas et venaesectio), quam-
 -am in hoc morbo fere semper optimo cum

eventu sunt data, inflammationem existentem non demonstrant, quum eadem medicamenta in varia ratione et in variis morbis cum utilitate adhiberi possunt. — Quis autem contra magnam inflammationem laudanum, oleum menth. pip. et cajeput et alia olea aetherea et medicamenta incitantia, quae in cholera saepe cum utilitate in usum vocantur, adhiberet? Nonne haec medicamenta opinatam inflammationem rejiciunt et contra eam dicunt? Exempli etiam docent, interdum sed raro venae-sectionem non institutam esse, sed remedia incitantia cum utilitate in usum vocata esse; ubi autem venaesectio non opus est, et remediis incitantibus utuntur, in his casibus profecto inflammatio non existit. — — Morbosa signa, quae in cerebro et medulla spinali inveniuntur, et quidem arachnoidea non pellucida et cum pia matre accreta, frequens exsudatio sanguinosae lymphae sub pia matre et in cranio et in columna vertebrali, magna vasorum sanguiferorum congestio, piae matris, praecipue circa caudam equinam, interdum medullae spinalis substantia subruer et mollis — evidentem quidem statum inflammatorium ostendunt, eo magis autem inflammatio est dubitanda, quum durante morbo talia symptomata absunt, e quibus de morbo magno cerebri et medullae spinalis conjectura fieri potest. — Alii ea de causa inflammationem probare credunt, quod urinae secreti est impedita. Ubi autem magna copia materialium aquosarum vomitibus et alvi dejectionibus excernitur, renibus materia evacuanda fortasse

et; praeterea autem spastica vi urinae secretio
cedi potest.

Ex his omnibus commemoratis argumentis
clammmodo elucet, cholerae naturam non mere
inflammatoriam esse. —

Systema nervosum in cholera magnopere mor-
bum esse, quod facile symptomatibus multis spas-
mum intelligi potest, nemo negabit. Attamen ce-
rum leviter modo est morbosum, quum ejus
excitationes conscientiam et memoriam saepe etiam
prius tempore ante mortem manifestant. — Multo
prius autem abdominis nervi male affici videntur,
in quibus ille dolor ardens et premens characteris-
ticus in regione epigastrica verosimiliter oritur.
Nervus abdominis medulla spinalis etiam excita-
tur et ex hac excitatione etiam symptomata spas-
morum extremitatum oriri videntur.

Ob symptomata spastica Curtis hunc morbum,
choleram spasticam nominavit. — Dozent credi-
t cholerae naturam consistere in vehemente
contractione totius canalisi alimentarii et quidem clonico
in vicem constrictione et extensione ideoque
morbum epilepsiam canalisi alimentarii nominavit.
Eadem sententia est Berends (l. c.). — Tho-
mas choleram numerat ad neuroses. Loder na-
mque quaerit in affectione plexus solaris. Ke-
dren contendit, choleram epidemicam in ner-
vosum spasmodica incitatione consistere. Scott cre-
dit, morbum e minuta nervorum vi oriri. Ken-
ny choleram contusione cerebri orta et quidem
oculta causa effici putavit. Ludwig (l. c.)

dicit » causa proxima est materia acris, intestin
 » stimulans et in duodeno potissimum haerens; i
 » hac enim intestinorum parte et ob nexum et si
 » situm ejus prorsus singularem, materia non rit
 » digesta et acris obicem invenit, morbum inchoat
 » tumultus inde sursum deorsumque continuat, con
 » strictiones et quasi convulsivos motus ventriculi
 » intestinorum et abdominalium musculorum con
 » citat. « —

Systema nervosum magnam cholerae partem
 occupare, concedi debet, non autem in spasmis so-
 lummodo vera cholerae natura ponitur, et jam e-
 de causa, quod nondum certe persuasum est,
 utrum spasmi hujus morbi in via primaria, an se-
 cundaria (quod posterius mihi verosimilius est)
 orti sint.

Propius fortasse ad veram cholerae naturam
 accedamus si maximam sanguinis mutationem, du-
 rante hoc morbo, diligentius consideramus. Quum
 sanguinis oxydatio vel decarbonisatio aliqua ex
 causa impedita est, haec propria et celer sangui-
 nis mutatio vim insolitam in functiones vitales ha-
 bet, et multa hujus morbi symptomata ex hac
 causa facilius sunt intelligenda.

Sanguis venosus est niger, densus saepe vis-
 cidus, et non amplius ventriculum cordis sinistrum
 incitare et ad reactionem impellere valet. Quam
 ob rem cordis pulsatio est debilis et levis, ita ut
 pulsus sensim sensimque extinguatur. Arteriae
 insolitum sanguinem non accipere possunt, qua de
 causa sanguis colligitur et accumulatur in venis

us corporis easque extendit, ideoque extremi-
 es et quoque facies, ubi cutis tenuior est, sub-
 eruleum colorem accipiunt. — Sanguinis circu-
 lo partim impeditur vel potius omnino pertur-
 batur, ex quo plerique medici spasmos (quod
 magis quam verosimile est) respirationem
 oppressam, pectori anxietatem, gravedinem in
 de et cordis scrobiculo oriri explicant. Tenuēs
 eriae nullum sanguinem ad peripheriam addu-
 unt, quam ob rem cutis functiones sunt sup-
 pressae, quae autem verosimiliter ad canalem ali-
 mentarium transferuntur, indeque illa permaxima
 humorum copia aquosorum verosimiliter oritur,
 quae partim vomitionibus partim alvo secernitur.
 Jähnichen (l. c.) credit, choleram in singu-
 la directa sanguinis analysi, in sejunctione flui-
 dum partium a solidis positam esse, et illas par-
 tes fluidas semper transsudationem per superficiem
 intestinalem petere. — — Ille viscidus et frigidus
 humor, quo corpus in posteris morbi vehementibus
 affectionibus obtegitur, fortasse naturae opera ad
 carbonisationem sanguinis in venis haerentis con-
 sideranda est.

Haec sanguinis qualitas est res maximi mo-
 menti in considerata cholerae natura. Attamen-
 neque symptomata e sanguini mutato explicata
 aliis medicis iterum simili modo a nervorum
 derivantur, dicentibus, morbosos et incitados
 nervos vim perversam habere in vasa sanguifera,
 sanguinis congestionem favere et sanguinem in par-
 tes interiores pellere, inde mutatam cordis pul-

sationem arteriarumque, anxietatem, inquietudinem cutis colorem pallidum et frigus, vertiginem, dysacoiam, capitis obnubilationem et capitis alias affectiones oriri. Tali ratione alia adhuc symptomata nervorum perversa vi explicantur.

Utrum igitur spasmi congestionem sanguinis, an sanguinis congestio spasmos efficiant, major et propria experientia certius judicare potest. Hoc mihi persuasum est, choleram in perversa et valde morbosa functione systematis sanguiferi et nervosi positam esse.

Restat nunc adhuc nonnulla de bilis secretionem disserere. Priori tempore natura cholerae posita est non solum in aucta bilis secretionem, sed etiam et plerumque in morbosa bilis secretionem. Haec sententia ab omnibus fere antiquissimi temporis medicis usque ad Saunderum recte judicatur.

Crediderunt enim, bilem in vesica fellea se colligere ibique haerere, simulque eam vel aestus calore acrem fieri vel miasmate epidemico, neque minus existimaverunt, talem acrem bilem, si subito in canalem alimentarium infunditur, ventriculum et omnino canalem alimentarium ad vehementes secretionem incitare. — Hippocrates (popul. v. 27) narrat »Bianti pugili, quum natura vorax esset, contigit ut in affectiones cholicas, bilis sursum ac deorsum exeuntes delaberetur« etc. — J. Lommius dicit »bilis supra infraque magno impetu prorumpit, primum liquidior, pallida et subflava, dein crassior majorem colorem exhibens flavum scilicet prasinum coerulenm aut etiam nigrum. —

Nunc autem jam plures medici et nominatim
 tis, Chisholm praecipue autem Johnson
 entiam contrariam in hac cholera epidemica, et
 em de impedita non suppressa bilis secretionem
 s argumentis defenderunt. Nonnulli medici
 ditam bilis secretionem propterea oriri putant,
 refrigerium cutis transpirationem supprimit;
 iam autem cutis functiones cum iis hepatis et
 bilis secretionem cohaerent, ea de causa quo-
 bilis secretio impediretur, ita ut ea iterum
 ens bonum signum inter morbum haberetur.
 tis inter alia dicit, aegrotum, si bilis in alvi
 tionibus apparuit, in meliorem conditionem
 se et morbum faustum eventum habuisse. —
 medici naturam cholerae epidemicae in spastica
 um choledochorum constrictione ponunt, qua
 in duodenum infundi impeditur, et confirmant
 sententiam eo, quod durante morbo secretio
 absit, dum post mortem vesica felle cum
 completa invenitur.

Bilem in cholera hac epidemica non, ut fieri
 secerni minime negari potest et jam e pleris-
 t apud viventes et in cadaveribus institutis
 rationibus facile est intellectu; attamen vero
 io bilis mutata non tanti momenti est ut prae-
 in hac re cholerae natura ponatur.

Quod denique ad explicandam naturam chole-
 rentias de inflammationis varietate, de irri-
 inflammata (irritation phlogistique. Gravier,
 ssa is); de nervositate (Tilesius), de in-
 atione spuria et occulta attinet, nihil aliud

nisi incertum et indefinitum de hac re mihi ostendunt. In arte medica nihil spurium; nihil occultum esse licet, melius est dicere »nescio«; tu enim idem et alii cum majori studio ad incognitum detegendum contendunt et levi judicio non erunt contenti. —

DE CAUSIS OCCASIONALIBUS ET PRAEDISPONENTIBUS.

Hippocrates jam dicit, morbos, si anni tempora insolito modo praetereunt, etiam irregulares et insolitos esse. — Sine ullo dubio concedendum est, varietates et mutationes aëris et omnino anni tempora permulta ad morbos varios, quibus homines sunt subjecti, conferre.

Huic sententiae in cholera judicanda omnes medici consentiunt. In quamam re autem haec varietas et mutatio anni temporum constat, nondum plane est apertum. Multi medici, exempli causa Hunter, Macartney, Abernethy, Newton, Davy, Ritter Johnson, Annesley, credunt choleram in mutata electricitate, quae ex eorum sententia cum humanae vitae functionibus magis pere complicita sit et cohaereat, esse positam. Alii medici in tenuibus invisibilibus aeris principiiis, alii in quibusdam soli exhalationibus morbificis, alii in aeris humiditate (Pringle) cholerae originem quaerunt. Schnurrer (l.c.) credit, cholera positam esse in variis rationibus telluricis, et pro-

e quidem in terrae motibus et concussionibus
anicis, quamquam experientia contradicit et do-
nec ante nec post haec phaenomena choleram
per adfuisse. Cleghorn, Sydenham, Cul-
existimant, choleram praecipue ex atmosphaera
e calida oriri.

Omnes vero haec causae partim hypotheticae,
im quidem verosimiles nec autem constantes
considerandae. Temporibus omnibus choleram
are posse, experientia jam docuit. Morbus hic
epidemicus ex mea quidem sententia ab in-
ita aeris et temporum anni mutatione pendere
tur. —

Plerique medici (Hippocrates, Ammia-
Marcellinus Bacon, Short, Rutty,
cham, Jameson, Annesley, Good,
per) consentiunt a calore perdurante, quem
frigus moderatius sequitur, causam occasiona-
cholerae proficisci. Haec enim celer tempera-
e mutatio facillime refrigerium efficit. Homines
amque vespertino et nocturno tempore refrige-
expositi sunt; quam ob rem multi hoc tempore
o hoc morbo corripuntur. Huc igitur pertinet
anea refrigeratio aëris vehemente et largi im-
ventus frigidi, sicci post calidam humidam
couditionem. E sententia nonnullorum medi-
m quaeque cholera epidemica anni tempore
o incepit, quo refrigerium faciliter accidere
st, et tunc per brevius aut longius tempus cho-
duravit.

Aliae porro causae, quae cholerae favent sunt Potus frigidi calente corpore; nimius usus frigidorum, vel magnopere pinguium, corruptorum vel non recentum ciborum; nimius usus potuum spirituosorum, novi vini; porro piscium ova (praeicipue Cyprini barbi L. Lucius barba) deinde corrupta caro poma multa acidula, cucumis melo, cucumis, praeicipue quum post horum fructuum usum multum bibitur; denique si ventriculus cibis obruitur.

Praeicipue autem ad choleram disponuntur, qui per longum tempus in solis ardore laboraverunt et mox ineuntibus frigidis nebulis vel frigidis noctibus refrigerium acceperunt; commoratio continua in frigido et humido aere; accubatio corpore sudante in solo humido; domicilia humida et profunda paludes; aquae putrescentes; interrupta et impedita sanguinis circulatio; magis venosus et carboneo hydrogenio aliisque acribus materiis nimie auctus sanguis abdominis; suppressa vel retrograda cutis transpiratio; refrigerium pedum; pediluvia pedum incauta; arthritis retrograda; suppressae haemorrhoides, lochiae et menstruatio; loci, in quibus febres intermittentes et remittentes regnare solent, cholerae favere videntur (Annesley); omnia, quae corpus directe vel indirecte debilitant, quam ob rem fames, omnis nimia virium contentio, magnae et periculosae cupiditates et vehementes animi affectiones, ira, molestiae, terror etc. praeicipue autem morbi timor et anxietas; doses magnae medicamentorum, quae vomitum, diarrhoeam et spasmos in ventriculo et omnino in canali alimentario incitare possunt.

SMPYTOMATA.

Cholerae symptomata et qualitative et quantitative varia apparent, quod et a majore aut minore dispositione, et a bona vel mala, forti aut debili corporis constitutione pendet; quod cholera ingreditur.

Plerique medici hucusque omnia morbi symptomata e decursu nominaverunt, attamen nulla stadia eorum distulerunt. Ii, qui primi stadia acceperunt, praecipue Adam, Anneslëy, Coldge, Lindgroen, Hasper et nonnulli medici Russici sunt. Sed non solum horum stadiorum nominatio, sed etiam constituendi eorum fines, cum omnia symptomata singulorum stadiorum non magnam disjunctionem ostendunt, difficultates praesentant, neque tempus est accurate definiendum; quod unum stadium in alterum transeat:

I. Stadium prodromorum seu invasionis:

Facies instantem morbum praecipue indicat et eadem anxietate quadam, magna et singulari inquietudine, tristitia, dum aegrotus interrogatus nulli dolores et omnino nihil accusat, imo etiam in hac conditione dicit, se bene agere. Ea de causa summi momenti est; ne medicus aegrotum initio morbi examinans fallatur. — Pulsus quidem accipiens plenus et durus, plerumque autem acceleratus et suppressus, ceterum non ejusmodi ut medicorum attentum faciat. Mox autem ab aegrotato titur: nausea, quaedam capitis gravitas et ob-

nubilatio, magna debilitas et lassitudo, plenitudo quaedam ventriculi, molestiae in ventriculo et tractu intestinali; leves in musculis extremitatum praetereuntes dolores (Burrell); agrypnia; paulum frigore tactum horrere; nulli abdominis dolores etiamsi abdomen prematur. Excrementorum qualitas hoc tempore pendet a conditione digestionis, plerumque autem hae sunt consistentiae minoris. Urinae secretio est parca et rara. Abdomen intersum.

Haec omnia symptomata non ordinem sequuntur, sed unum alterum aut antecedit aut sequitur; interdum plura eodem tempore apparent. Pleraque horum symptomatum sunt parvi momenti et leviter praetereunt, imo etiam interdum evanescent, ita ut aegrotus in bona conditione se existimet. Quam ob rem haec symptomata saepe non intente observantur, saepius autem aegrotorum culpa non videntur.

Quam diu hoc stadium duret, non certe constitui potest, et ab aegroti dispositione et intensitate contagii pendet.

II. Stadium eruptionis et incrementi.

Dolor characteristicus ardens inter scrôbiculum cordis et umbilicum. Vomitus primo ciborum, mox autem tenuis aquosi, aquae oryzae similis liquoris, in quo flocci mucosi et materiae albuminosae nant. Alvi dejectiones et quidem primo faecium restantium, deinde liquorum muscosorum, qui ple-

que magna cum vi sed sine dolore dejectiuntur. Secretiones primum, ut jam dictum, sine doloribus apparent, sensim sensimque autem cum vehementibus torminibus et tenesmo conjunguntur. Aegrotus post has primas secretiones in meliori conditione se credit, sed paulo post vel nonnullis interlapsis sexagesimis horae partibus valde frémitus et dolorosae alvi secretiones sequuntur. Corporis vires labuntur; extremitates frigescunt, a frigido frigidoque sudore interdum teguntur, sunt facies subcoerulei et corrugantur; facies decomposita et collapsa; aspectus perturbatus; oculi injecti, cum subcoeruleo annulo circumdati, languidi. — Abdominis dolores ostendunt typum quadam periodicum et magna cum vehementia nonnullarum horae sexagesimarum partium intervalla redeunt et aegrotum cogunt, ut alvum evacuet. Quae autem excretiones alvinæ hos dolores impetus vehementes aliquantulum minuunt. Dejectiones nunc semper frequentius et uberior observantur, et valde notatu est dignum, in maxima copia liquores alvini excernantur. Tussis magnopere frequens. Potus etiam in maxima copia sumti, statim iterum evomuntur. Quum aegrotus se movet, tunc statim dolores abdominis redeunt et cum his etiam secretiones alvinæ. Malignus frigus occupat extremitates præcipue brachia, pedes, carpum et genu. Sitis continua, maxima intolerabilis, simulque autem lingua est humida, calida et mucositate albo oblecta. Dolores abdominis redeunt frequentiores et fortiores, præcipue auctus

dolor ardens in regione epigastrica, quae calida est tangenda. Spasmi magis tonici quam clonici, in universum vero maxime varii primum extremitates omnes corripunt, magis magisque augentur. Extremitatibus invasis proxime corripuntur abdominis, tunc pectoris et diaphragmatis musculi; faciei autem, dorsi et regionis lumbalis musculi nunquam vel rarissime in hoc morbo a spasmis invaduntur. Cum his spasmis aurium susurrus, interdum surditas, quaedam vertigo, majores molestiae in regione epigastrica et praecordiis conjunguntur. Universus virium collapsus, respiratio difficilis, interrupta et omnino irregularis. Pupillae dilatatae. Pulsus adhuc debiliior et levior ac antea, ita ut paene in carpo tangi possit. Spastici impetus in extremitatibus multo fortiores et frequentiores.

Hoc stadio durante secretio urinae est parca et quidem sine colore et cum molestiis fit, plerumque autem esse solet suppressa urinae secretio. Secretio bilis non observatur. Numquam enim in hoc stadio vestigium bilis ullum in secretis animadvertitur et non prius apparet nisi morbi vehementia minuitur et bilis iterum in duodenum influere potest. Secretio omnium glandularum est impedita. — Sanguis est niger, crassus, viscidus oleosus, interdum non e vena fluere vult; sanguis arteriosus formam sanguinis venosae plerumque habet.

III. Stadium exitus.

a) Malus exitus.

Dolores abdominis summum vehementiae gradum assequuntur simulque frequentiores et magis continui sunt. Respiratio aut valde lenta et oppressa aut accelerata et impedita; pulsus in carpo tangitur; spiritus frigidus; os et lingua magis resiccant; oculi rigentes; cornea languidum adtactum praebet et collabitur; corporis cutis magis rugatur, praecipue in extremitatibus, quasi per longum tempus hae in aqua calida fuissent. Frigus totum corpus occupat. Sudor viscidus, frigidus in toto corpore prorumpit. Vox debilis, tremula, et singulariter mutata, inde illud characteristicum nomen »vox cholERICA«. Permagna inquietudo et anxietas, lipothymia. Facies hippocratica. Mors.

Vomitibus et alvi secretionibus brevi tempore antea cessantibus desinunt, interdum autem fieri solet, liqorem ichorosum ex ore et ano fluere, usque ad mortem moritur.

Conscientia et omnes fere animi vires usque ad mortem manent.

In pessimo cholerae statu spasmi repente cessant, ita ut aegroti vigintas sexagesimas horas vixentes, aut dimidiam horae partem usque ad duas horas lethargici fiant et moriantur. In hac conditione aegrotus nihil accusat, nihil postulat nisi quietem. Nec vomitus, nec alvi dejectiones.

tiones, nec inquietudo, nec sītis adsunt. Vires autem animi turbatae sunt.

b) Bonus exitus.

Quum morbum ad bonum finem se vertit tunc excretiones alvinae et vomitus minuuntur. Bilis secretionis vestigia iterum apparent, quod semper hoc tempore faustum signum est habendum. Inclinatione ad urinam mittendam iterum rediit, autem urina mittitur. Pulsus, quamquam adhuc debilis et levis, magis magisque plenior, durior et regularior sentitur. Calor cutis rediit et augetur. Sitis vehemens et ille dolor ardens in regione epigastrica minuitur. Excretiones sursum et deorsum et spasmi non solum mitiores sunt et rarius apparent, sed etiam sensim sensimque desistunt. Facies ad aspectum meliorem praebet. Cutis iterum calidior. Respiratio liberior et spiritus non amplius frigidus sed regularis. Oculi vegeti et clarescunt. Labia et os iterum rubescunt. Anxietas et inquietudo amittitur et aegrotus ad convalescentiam progreditur.

c) Morbi posthumi.

Non semper cholera cum fausto exitu directè in sanitatem transit, sed plerumque per longius tempus magna debilitas praecipue in toto digestivis apparatu remanet. Interdum etiam debilitas unius vel alterius extremitatum per plures dies post convalescentiam durans animadvertitur. In casibus singulis sed raris morbus etiam amentiam

quit, quod eo magis est admirandum, quoniam ante morbo stupor nec autem inconscientia observatur (Blumenthal l. c.).

Frequenter apparet transitus proprius in morbos inflammatorios, quorum autem decursus saepe conicus observatur. Non raro enim cholera in febres cum affectionibus inflammatoriis febris cutium, ventriculi, intestinorum et hepatis. Interdum febris nervosa stupida cum cholera conungitur et plerumque, si aegrotus in primis diebus non interficitur, in febrem nervosam lentam transit, quae in celeri aptorum medicamentorum sanatur, frequenter autem metastasibus et quinque parotidum tumoribus, finitur. — Saepe cholera in formam febris remittentis aut intermittens transit (Jameson, Subow Carpinski, Sslow, in l. c. Lichtenstädt). In nonnullis casibus observatum est, aegrotos, qui a cholera convalescere viderentur, a febre correptos esse, cuius character magnopere putridus fuit. Interdum occurrunt etiam e morbis posthumiis hydrops, amblyopia et surditas. — Nonnumquam cholera unum vel alterum ei propriorum symptomatum, exempli gratia vomitus post quemque ciborum potusque reijciuntur, perseverantes diarrhoeas, urinae retentionem reliquit. Sed hi casus hoc tempore vitari solent.

Symptomata diagnostica.

Sanguis venosus est niger, crassus, viscidus, non oxygenatus sed magis carbonisatus, inde in

organis interioribus colligitur et organorum functiones corrumpit. Aucta secretio ventriculi et canalisi alimentarii sursum deorsumque. Impedita bilis secretio. Suppressa urinae secretio. Dolor ardens characteristicus in regione epigastrica et cordis scrobiculo. Spasmi. Corrugatio extremitatum. Animus demissus et afflictatus. Conscientia usque ferè brevi tempore ante mortem semper manens. Vox singulari modo mutata, inde etiam ab nonnullis »vox cholericæ« nominata. Status exhaustus omnium fere functionum vitalium. Faciei insolitus aspectus.

Quantopere hæc cholera epidemica his symptomatibus a cholera priorum temporum et aliis morbis differat, facile est intellectu.

Symptomata prognostica,
ex iis locis elucent, in quibus supra sub a et b, studii tertii sermo erat.

Denique notandum est, symptomata hujus morbi non semper ordinem eundem observare et nonnulla imò characteristica interdum abesse. Plerumque cholera juxta cetera symptomata cum diarrhoea incipit, quam vomitus, spasmi et alia symptomata descripta sequuntur. Rarius cholera cum diarrhoea, spasmis ceterisque symptomatibus et quidem sine vomitu apparuit, et multo rarius casus contrarius. Sunt adhuc aliae in phaenomenis morbi abnormitates, quas omnes autem referre hujus libelli spatium non licet.

DE ORGANORUM FUNCTIONE INTER HUNC MORBUM.

De functionibus cerebri et nervorum,

Quamquam conscientia manet usque ad mortem, attamen conditio aegroti interdum debilitatis est, quam ebrietas efficit. — Caput est mole grave, pariter dolorosum in variis ejus locis. Aegrotus interdum vertigine laborat et aliis jam notis capitis affectionibus. — Spasmi sunt modo clonici modo clonicae modo inmixtae naturae et gaudent pedum, manuum et digitorum musculorum primum ut fieri solet, corripunt, modo hic, illo illuc apparentes, nunquam autem simul musculorum extensorum et intensorum invadentes. Deinde spasmi abdominis et tunc pectoris musculos aggrediuntur. Extremitates superiores multo frequentius quam inferiores a spasmodicis corripuntur. Musculi autem faciei, colli et dorsi numquam vel raramente hac spastica constrictione laborant. Si musculus spasmo corripitur, pars ejus carnosa contrahitur et format durum quasi nodum cum tanta firmitudine et vehementia, ut aegrotus propter atrocissimos dolores magnopere exclamat. Frictiones et fomentationes interdum hos spasmos ab una parte musculorum ad alteram pellunt. Dolore ceptae partis paene cessante, mox novus clonus et novum impetum et dolorem indicat. — Spasmi etiam in toto ventriculo, duodeno et ductibus biliaribus (unde quoque a nonnullis bilis impedita excretio explicatur) domicilium suum habere vide-

tur. Scott narrat, memorabilem musculorum abdominis fortissimam constrictionem spasticam interdum esse, ita ut abdomen ad spinam vertebrarum contrahitur. Marshall narrat duos casus, in quibus spasmi orti sunt, postquam aegroti jam mortui existimabantur. In duobus casibus aegroti per totum morbum nullis spasmis laboraverunt.

b) De functionibus pulmonum.

Tussis et pectoris dolores nunquam observantur. Initio morbi respiratio est accelerata et fortior, progrediente autem morbo sensim sensimque lentior fit, mox autem interrupta usque paulatim omnino desiit. Dr. Davy observavit, aerem e pulmonibus exhalatum acidi carbonici, quod apud sanos plerumque adest, tertiam partem continuisse. — Interdum muscoli ad respirationem necessariam a spasmis corripuntur, tunc respiratio esse videtur asthmatica.

c) Functiones cordis, arteriarum, et sanguinis conditio.

In primo impetu morbi pulsatio cordis et arteriarum, quod attinet ejus frequentiam et fortitudinem, augetur, sed raro magis quam centum pulsus ictus per tempus unius horae sexagesimae partis sentitur, et jam post breve tempus dimidia horae usque ad horam integram arteriarum pulsatio in omnibus ramis manifeste imminuta est et arteriarum vis in capite, ei in corde, quod adhuc valens manet, respondet. Attamen cordis vis ab

gra valetudine et a vehemente inflammatione
 opere se differt, ea de causa Conwell cor-
 pulsationem molestam et operosam pugnam ap-
 at. — Pulsus in carpo morbi initio est varius,
 ediente autem morbo semper semperque de-
 r, irregularior, lentior fit et saepe incunte
 no et vomitu in externis extremitatibus non
 lius est sentiendus; attamen aegroti adhuc per
 mod tempus interdum vivunt, cujus Kellet
 orabile exemplum narrat. — Cutis venae et
 riae interdum sub hac conditione adhuc anim-
 rtuntur, nec omnino sunt collapsae, si etiam
 us non amplius sentiuntur. Si haec vasa in
 statu aperiuntur, sanguis in iis contentus ef-
 , tunc vasorum parietes mox collabuntur et
 uis non amplius apparet.

Singularis qualitatis est sanguis in hoc morbo.
 nim morbi initio venaesectio instituitur, tunc
 ic quidem sanguis effluit, attamen maxime est
 cydatus, niger, crassus, imo etiam imminutae
 peraturae. Numquam sanguis in efformata cho-
 venaesectio detractus in serum et cruorem se-
 gitur, sed celeriter ad massam homogeneam coa-
 tur. In minori cholerae vehementia aliquantu-
 quidem serum sejungitur, sed etiam in his casi-
 nulla crusta inflammatoria videnda erat. — Si
 sanguis venosus et niger aëri exponitur, tunc
 rubrum colorem accipit. — In iis casibus, ubi
 era cum incitationis signis incepit, hic sanguinis
 r color minus observatur, quam si morbus
 virium collapsu incessit.

d) De functionibus ventriculi et intesti- norum.

Plerumque huic morbo perturbationes in ventriculo et intestinis praecedunt, quod eo magis est observandum, quoniam signa indicantia imminenti morbi esse possunt. Nonnulli aegroti ciborum satietatem, alii dolorem in regione cordis serobiculi, alii sensum prementem, vel constrictionem, praecipue calorem ardentem in regione epigastrica accusant; tum sequitur nausea, vomitus, diarrhoea et quidem sine doloribus vel molestiis. Nonnulli aegroti post excretiones bene se habere putant. — Primae alvi excretiones cibos et in universum faeces continent. Si in ventriculo nulli amplius cibi adsunt, tunc evomita massa fuit liquida, viseida, sine odore et gustu, sine colore vel subalbi coloris, interdum substantias floccosas, nullum autem bilis vestigium continuit. — Si canalis alimentarius vacuus erat, tum sequentes excretiones in floceosis, evomitis substantiis similibus, viscidis liquoribus sine odore constiterunt, qui interdum parvas, nigras natantes partes continuerunt. — Copia et frequentia secretorum sensim sensimque et saepe incredibili modo augetur, abdomen collabitur, et molestus dolor in abdomine accusatur. Si lethargia intravit, tum vomitus cessavit, sed alvinae excretiones involuntarie continuatae sunt et interdum frequentius, imo etiam post mortem multa liquida ex ore et ano effluerunt.

Sitis insatiabilis, sicut ardens ille dolor in regione epigastrica, fuerunt manentia symptomata.

De bilis, urinae et salivae secretionibus.

Bilis secretio in hoc morbo non suppressa sed us impedita est. Nam bilis transitus in duodeno constrictione ductuum choledochorum spasticae similiter plerumque prohibetur, quod e vesica bile completa in cadaverum sectione observatur, et e valde angustis ductibus cysticis elucet.

Urinae secretio est morbi initio parca, postea plerumque suppressa, quod nonnulli e consuetudine nervoso explicant, alii autem ex eo, quod ureum in sanguine aegrotorum reperitur, hanc causam quoque renes nullam urinam e sanguine excreverne possunt. Verosimiliter deficiens urinae secretio explicatur e nimia copia sursum deorsumque repletorum aquosorum, de qua re jam supra sermo

Quamquam nausea, quae in aliis morbis secundum experientiam salivae excretionem augere solet, plerumque accusatur, attamen in hac cholera epidemica salivae secretio non solum parca et rara sed plerumque suppressa observatur. —

f) De functione cutis.

Cutis aequali modo ac in hominibus, qui morbo canalis alimentarii laborant, se habet, et fere per frigida est, saepe viscido, profusos sudore repleta, plerumque autem sicca et brevi tempore ante mortem calida et praecipue in trunco et ca-

Frigus et siccitas cutis e consensu cum ventriculo et canali alimentario a nonnullis medicis explicantur, alii autem originem ducunt e circulatione penitus e peripheria cessante et e circulatione suppressa in vasis capillaribus superficiei cutis. — Si omnes vires collapsae sunt, tum cutis est insensibilis, vesicatoria nullum effectum praebent, imo etiam acida mineralia et aqua calida. Scott hanc insensibilitatem minuta vi in cutem explicare studet. — Cutem praecipue in digitorum apice flaccidam interdum fuisse et brunneum colorem habuisse quoque observatum est. —

DE SANANDI REMEDIIS.

Cholera est tantus et periculosus morbus, tam saepe et celeriter mortem affert, ut omnia in recta et bona sanandi methodo et quidem aptorum et efficacium remediorum celeri applicatione posita sint ad quem finem aegrotus nullum temporis momentum amittere liceat, quum tempus magnopere sit pretiosum ad servandam vitam. Sanationi attamen adhuc impedimenta sunt, quoniam primum morbi symptomata nondum satis cognita et explicata sunt; deinde quod medicamenta contra choleram commendata non ubique nec omni tempore eandem utilitatem, parem vim et eundem effectum praebuerunt. — Quis autem non concedat, characterem morbi, qui jam in tam variis terris et variis temporibus apparuit, in ejus symptomatibus non eundem manere.

locorum situs et solum, aër, anni tempora
 quino climaticae rationes quendam vim in chole-
 rignitatem aut malignitatem haberent? Num
 ubique eadem constitutio est, pares vires
 et valetudinis conditio, si a cholera corrip-
 ti? In multis Indii ab Europaeis et hi iterum
 differunt. Nonne igitur apud morbi et
 hanc varietatem etiam vim et effectum
 eorum varium esse oportet? Praecipue
 sententia igitur est opus, ut medicus, ubi-
 que sit, loci et climatis qualitates et homines,
 eorum vivendi rationem, vires, temperamenta
 accurate cognoscat et cum diligente usu ex-
 perientiae ab aliis jam factae ipsi suae experien-
 tiae tradat, et omni tempore e suo iudicio et ex-
 perientia sanandi methodum instituat.

Huic parvo libello non licet omnes sanandi
 modos, omniaque in hunc morbum adhibita me-
 dicamenta afferre. Quam ob rem me contentum
 oportet ea remedia commemorare, quae in
 plerumque utilitatem praebuerunt, aut com-
 munita sunt. —

Primae indicationes consistunt in tollenda or-
 ganorum internorum congestione, in evitanda or-
 ganorum abdominalium inflammatione et in sangui-
 ne circulatione, regulari transpiratione, bilis secre-
 tione restituenda; deinde in spasmodorum, vomitus
 et diarrhoeae suppressione et in tollendis morbo-
 sis visceribus, quae in canalem alimentarium secretas
 et accumulatae sunt.

SANGUINIS DETRACTIO.

Inter primas indicationes pertinet, ut congestio sanguinis in inferiora organa tollatur et regularis sanguinis circulatio restituatur. Quam ob rem venaesectione praecipue est cogitandum. Cuius consilium est sanguinis copiam imminuere, ut cordi et pulmones ab oppressione liberentur et functionibus iterum praestare possint. Hoc autem solummodo in prioribus morbi stadiis fieri potest, priusquam pulsatio in carpo cessavit. Auxilium celerius igitur opus est. Postero tempore sanguis raro e venis effluere vult, vel tantummodo in parva copia, ita ut sanationis spes absit. Interdum quidem magna sanguinis copia effluxit, tunc autem effluere subito cessavit, et aegrotus celeriter mortuus est. In his casibus ea sanguinis pars detracta esse videtur quae in venis fuit, quum jam circulatio desiit et venae evacuatae erant. Itaque etiam nonnullorum sententia falsa oritur, mortem [quae his in casibus etiam sine venaesectione intrasset, quum morbus nimie progressus esset] venaesectione acceleratam esse. — In aliis casibus aegroti etiam post venaesectionem in posteris stadiis convaluerunt; tunc scilicet ex medici voluntate tam diu sanguis effluxit usque circulatio facta est regularis. Initio sanguis fuit crassus, niger, apparuit guttatim, sensim sensimque autem tenuior erupit, et quum rubram colorem acciperet, quod semper signum sanationis faustum est existimandum, facilius effluxit et statim venaesectio a medico finita est.

E symptomatibus venaesectionem reiterare licet si opus est venaesectionem nonnunquam ree, tunc nonnulli commendant, eam sensim sententiae in omnibus quatuor extremitatibus instituere. Annesley consulit in omnibus eadem et in omni stadio venaesectionem instituere. Interdum in posteris morbi stadiis excitatorius motus accidit, qui verosimiliter indicat, eam restituere circulationem studere. Hoc morbi momentum minime ad venaesectionem admodum negligendum est.

Nonnulli quidem aegroti etiam sine venaesectione convaluerunt; sed in hac sanandi methodo peritus mortuorum semper major fuit, quam convalescentium. Experientia etiam docet, nullum casum morbi sine congestione periculosa in vena vel alterum organon apparere. Quam ob rem non liceat, solummodo alia remedia sine sanguinis detractioe adhibere.

Sanguinis detractio etiam, exempli causa, ad meliorem opii, medicamenti in cholera boni, parat. — —

Si igitur his venaesectionibus sanguinis copia augetur, tunc etiam cor iterum facilius se contrahere valet et sanguinis oxydatio et decarbonisatio quod maximi momenti est, melius procedit, sanguis ergo deoxydatus tollitur, ex quo vitiorum organorum functiones et nutritiones restituantur.

Quum venaesectio non amplius institui possit, sanguis non effluere vult et simulque symp-

tomata periculosa minantur, tunc hirudines in loco idoneos applicandae sunt. — Si post venaesectionem abdomen est dolorosum et digitorum tactu non ferre potest, item apud capitis molestas affectiones, aliarumque partium corporis dolore magnos, tunc etiam hirudines adhibendae sunt.

Sed venaesectio, si modo institui potest, hirudinibus semper anteponenda est. Illi casus tantummodo excipiendi sunt, in quibus cholera cum permagna omnium virium consumptione intrat.

Sanguinis detractiones locales solummodo adhibitae raro magnam utilitatem praebuerunt, quod vasa sanguifera magna non satis celeriter evacuari possunt; sanguinis igitur circulatio manet impedita, et celerem utilitatem, quae e venaesectione sequitur, non assequitur. —

Pulsuum conditionis rationem ante venaesectionem habere, non semper opus est, quum saepe in maximo vitae periculo, ubi venaesectio optimum effectum praebet, pulsus saepe ob debilitatem paene tangi potest.

Quod attinet sanguinis detrahendi copiam, semper haec in omnibus morbi casibus e constitutione aegroti et symptomatum vehementia terminatur. —

Symptomata, quae praeter congestionem, sanguinis detractionem indicant, haec sunt: dolor vehemens et ardens in regione scrobiculi cordis et umbilicali, magnae respirationis molestiae, pectoris anxietas, capitis magni dolores, gravitas et obnubilatio simulque magna photophobia. —

Calomelas.

Sicut apud omnia in cholera adhibita medicamenta, ita quoque de mercurio dulci non omnes ei consentiunt, quorum alii utilitatem ejus agnoscunt, alii autem negant; plerique tamen conveniunt, hoc medicamentum in cholera magnopere esse utile.

Hydrargyrum muriaticum mite post venaesectum tunc bene adhibetur, si paucae alvi dejectiones adfuerunt, si bilis haerens evacuetur, hepaticae functiones liberiores fiant et alvi artificiosis dejectionibus pars corrupti sanguinis in canalem alvum transducatur et hac ratione sanguinis puritas melior reddatur. Magnae ejus doses adhibenda haec consilia aptae videntur. (Lichtenstein, c. I.). — Conwell dicit, mercurium dulcem sanguinis accumulationem et dispositionem ad retentionem sese inclinantem minuere et secretum ad valetudinem necessariis favere. Johnstone idem medicamentum adhibuit, ut proportionem regularem inter morbosam sensibilitatem et actiones restitueret, et bilis secretionem efficeret. Annesley mercurio dulci massam argillae coloris, (claycoloured), quam apud sectiones in intestinis crassis reperit, tollere voluit.

Ubi autem multae alvi dejectiones adfuerunt, mercurium aut in usum non vocatur aut conjunctum cum opio conjungitur. — In universam conjunctionem mercurii dulcis cum opio vel nucis vomicae valde laudatur, quod praecipue bilis secretionis

cretioni et excretioni favet. Aequali modo vi mercurii dulcis in conjunctione cum medicamenti antimonialibus commendatur ad restituendas secretioncs. — Corbyn adhibuit mercurium dulcem cum tinctura opii et oleo menth. pip. seu cajeputi. Alii conjunxerunt calom. cum extr. hyosc. vel cum herb. digit. vel apud permagnos spasmos et aegrotos valde sensibiles cum moscho vel cum castoreo.

Si alvi excretioncs virilem vel griseum colorem post usum hydr. muriat. mitis ostendunt, tunc ab hoc medicamento abstinendum est.

Medici anglici casu fortuito in doses magnas hujus medicamenti inducti sunt. Ex errore enim quidam aegrotus cholera laborans semel scrupulum integrum hydr. muriat. mit. et LX guttas tincturae opii sumpsit et convaluit. — — Apud homines robustae constitutionis majores doses calomelano utiliores esse et celerius auxilium afferre videntur, quam parvae et frequenter repetitae doses quibus intestina debilitantur et diarrhoea perdurat. Apud magnas etiam doses in hoc morbo Calomelas ptyalismum non excitavit et verosimiliter propterea, quod celeriter alvi dejectiones efficiuntur. — Quod denique in universum dosin ipsam et temporis intervallum, quo hoc medicamentum detur attinet, hoc e symptomatibus et viribus aegroti medici ipsi judicent. Non audeo dosin certam constituere, quod in aliis terris sunt alii homines aliarum virium. — Ex eadem causa in omnibus adhuc commemorandis medicamentis dosis a me incerta manebit. —

Opium.

Opium mox post eruptam choleram optimum remedium praebuit, nondum autem simili modo post eruptam choleram. — Hoc medicamentum contra morbosam ventriculi sensibilitatem, spasmos, et vomitum et alvi dejectiones frequentes, recto valde utile est. Sydenham (l. c.) dicit »at vero diligenter est animadvertendum, quod non accesserit medicus, nisi postquam aeger vomitu ac dejectionibus ad horas aliquam multas continuatis exhaustus at jam frigescent extrema membrorum; hoc inquam casu, omissis aliis quicunque auxiliis, recto cursu ad sacram hujus morbi anchoram, laudanum intelligo, confugiendum est; quod non tantum exhibendum est urgentibus symptomatibus sed etiam cessante vomitu ac diarrhoea etc. etc.« Frank (epitome curand. homin. morb. lib. V. p. II.) inter alia dicit »hie sola tinet. Thebaica ad guttas XV. primum post quartam quamvis horae partem, donec vomitus omnis sedetur, decem ad guttas vel saccharo instillata, vel cum aquae melissae vel similibus paucissima quantitate porrecta omnem hanc aginam absolvit. Necesse vero est a vomitu cessante non illico remedium suspendi, sed inter-
allis nunc quidquam longioribus, ac minores ad doses, nisi sopor insequatur, per dies aliquot exhiberi.«

Utrum magnae a medicis Anglicis datae doses (XX p. d.) necessariae sint, ex universis causis

nec negari nec concedi potest. Semper autem magnae doses in clysmatibus non commendandae sunt, quum experientia docet, opium per clyσμα adhibitum profecto non minorem vim quam per os habere.

In universum apud usum opii in hoc morbo semper valde cauti esse debemus, ne congestio cerebrum versus et quidam sopor oriatur, quod facilliter fieri possit.

Tam diu, quam pulsus durus et fortis sentitur, opio uti non licet. Si autem post venaesectionem pulsus est parvus et celer, et nimie aucta corporis sensibilitas remanet, tunc opium indicatum est. Hoc etiam praecipue referendum est ad ventriculi maximam sensibilitatem, in quo propter numerosos nervos symptomata spastica tam vehementia fieri possunt, ut aegrotus spastico statu moriri possit.

In efformata cholera magnae doses opii facillime maxima pericula (exempli gratia typhum) afferre possunt. Attamen parvae ejus doses semper utiles sunt, in his vero stadiis opium numquam solummodo est adhibendum, sed e consensu multorum medicorum cum hydr. muriat. mit. optime conjungitur.

Taylor commendat magis opium purum quam tincturam opii, quod tinctura adhibita saepe vomitus non minuitur sed augetur. Ex eadem causa Boyle iterum tinctura opii in clysmatibus utitur. — Si autem opium solummodo datum nec vomitus, nec spasmos minuit tunc ab aliis cum

amphora, calom. et apud symptomata periculosa
 cum moscho conjungitur.

Si vomitus, et alvinae excretiones nec vehementes nec in comitatu malignorum symptomatum
 sunt, tunc non semper opium statim in usum
 vocandum est, quum hae excretiones interdum naturae contentiones ad tollendas materias morbosas
 distimandae sunt.

Cessante vomitu et diarrhoea opii usus ad im-
 mediandos recidivos per nonnullum adhuc tempus
 commendatur.

(Calor, Balnea, Frictiones et Rubefacientia.

Haec remedia externa ad sanationem maxime
 utilia sunt, minime deesse debent, et primum lo-
 cum post venaesectionem occupant.

Prae omnibus calor et quidem calor siccus ex
 ista sententia magnopere in cholera commendandus
 et laudandus est. Calor ad restituendam san-
 guinis circulationem et cutis transpirationem mul-
 tum affert. Maxima esse utilitate credo, si aegro-
 tus semper calorem siccum et modicum accipere
 et ubique ab hoc circumdari possit. Quantam
 utilitatem epithemata calida et quidem sicca ex
 arena, sali, furfure, avena, cinere etc. afferant,
 inter omnes satis constat. Itaque commendata
 etiam balnea calida ex arena parata utilitatem pro-
 mittunt. — Quam utilitatem calor siccus praebet,
 inter multa exempla etiam hoc demonstrat: servus
 medici White, qui admoto magno igne corpus

calefaciebat et praeterea inunctionibus utebatur, convaluit (Conwell). — Nonne sanandi methodus civis Moscoviensis Chlebnikow, a nonnullis medicis commemorata in calore (quamquam etiam in calore humido) plerumque sicco posita est? Methodus ejus haec est: aegrotus accipit cochlear plenum magnesia (verosimiliter carbonicae), tunc tegumentis calidis simulque permulta et calidissima nec minus cum aqua ferventi perfusa foeni paleat egitur, ut transpiratio efficiatur. Si corpus post sudorem siccatum est, eadem methodus repetitur et postea aegroto liquor Hoffmanni et medicamenta roborantia dantur. Tinctura guajaci ab hoc cive quasi medicamentum palliativum commendatur.

Quum plerique medici modicum et calidum sudorem, ejus praesentia in hoc morbo plerumque faustum signum habetur, efficere student, ea de causa calor siccus eo magis est commendandus, quoniam aegrotus, dum calor adhibetur, nec tam faciliter refrigerio exponi nec ejus vires intendi possunt, quod in balneis calidis saepe accidit. —

Profecto autem non parvi momenti balnea calida sunt, et si quoque concedendum est, aegrotos saepe his balneis perfrigescere, vires eorum descendendo in balnea et escendo, defricando et vestiendo contenduntur, attamen minime dici potest, balnea calida plus nocere quam utilitatem afferre, quum haec incommoda jam commemorata faciliter et caute evitari posunt.

Quod attinet balneorum temperaturam a nonnullis calidissima balnea laudabantur, saepe autem non felicem eventum praebebant. Nimio enim calore magnus et profusus sudor evocatus est. Initio quidem morbi transpiratio universalis calida magis salutaris est; postea autem si aegrotus secretionibus frequentibus et continuis multas aquosae materias amisit, magnus sudor periculosus est, quod sanguis reliquo sero privatur, inde crassior et ideoque circulatio impeditur. Ex eo etiam elucet, cur multi aegroti post adhibita balnea calida majorem anxietatem et inquietudinem ostendunt. Quam ob rem primis morbi stadiis et quidem mox post primam venaesectionem balnea calida exhibenda sunt. Non jure Blumenbach rejicit usum balneorum universalium calidorum, dicens: commodum caloris ex his balneis ortum non solum praetereuns esse, sed etiam superari nocua oppresione quam aqua in corporis superficiem efficiat; unde sanguis adhuc magis ad internas partes pellatur et periculum suffocationis augeatur, quam ob rem aegroti in balneo non bene se habeant. — Quaeritur autem in quo morbi stadio, inter quae symptomata et in qua nam temperatura, de quibus omnibus Blumenbach nihil dicit, aegroti balneis usi sint. — Eo magis autem Blumenbach pedulivia calida commendat.

Sokolow dicit: balnea raro utilitatem habere, si spasmi jam inceperint; sed in vehemente anxietate, pulsu debili et frigidis extremitatibus periculosa fuerunt.

Balnea kalina à Tilesio commendata utilia quidem esse videntur; quaeritur autem, utrum eorum utilitas tam magna et omni tempore tam certa esset, sicut Tilesius contendit.

Majori et tutiori utilitate ea calida balnea mihi esse videntur, quae sanguinis temperaturam non multo magis excedunt.

Quam diu aegrotus in balneo maneat et quoties eo utatur, a symptomatibus pendet. Plerumque autem et cum maxima utilitate mox post primam venaesectionem balnea in usum vocantur. —

Absente ad balnea occasione pauperibus (sed etiam divitibus propter bonum effectum) haec methodus, a Purpurew laudata, commendanda, est: Aegrotus calidis tegumentis tegitur, sub quibus spatium satis magnum manet ad diffusionem vaporum ex aceto et aqua paratorum, quae liquida in lapidem candentem infunduntur. Hi vapores magnum sudorem calidum efficiunt, qui semper signum bonum instantis sanationis habendus est. Hoc experimentum e symptomatibus bis vel ter quotidie institutum est. (Lichtenstädt l. c. I.).

Balnea vaporina laudem quidem iis attributam merent, attamen majorem adhuc utilitatem afferrent, si ubique tali modo instituta essent, ut e medici voluntate caloris modus constitui possit.

Magnam etiam utilitatem promittunt epithemata calida spiritu camphorato et liquore ammonii (et fortasse etiam ex aliis aethereis medicamentis) parata, quae Sokolow propter bonum effectum commendat.

Lindgroen laudat epithemata calida ex her-
aromaticis et cum aceto parata in pedibus, mani-
s; et capite et dicit, haec epithemata in capite ap-
cata sensum injucundum in oculis reconditis, ver-
tinem et inclinationem ad vomitum ex hac profi-
centem statim suppressere aut mitigare.

Frictiones et rubefacientia quasi ea remedia,
ae etiam functiones cutis animant et restituunt,
plerisque medicis in cholera magnopere laudan-
et jam initio morbi adhibenda sunt. — Hae
ctiones instituuntur plerumque cum pannis laneis,
i vel calidi et sicci, vel baccis juniperi, succi-
o suffiti, vel aethereis, balsamicis liquoribus irri-
i sunt. Praecipue ad frictiones hoc linimentum,
od propter optimum effectum in cholera lini-
mentum antecholericum nominatum est et magnam
oriam assecutum est, laudatur:

Rp. Theriac. dr. ii.

Acid. nitr. dilut. unc. ii.

Ol. terebinth. unc. iii.

Mell. despum. unc. i.

Spirit. vin. rectific. unc. vi.

M. f. linimentum.

uae frictiones corporis frigus praecipue extremi-
tum tollunt, calorem, sanguinis circulationem in
ternis corporis partibus restituunt, et hoc modo
vulsionem efficiunt, spasticos impetus mitigant et
res excretionibus exhaustas elevant.

Interdum autem frictiones cum medicamentis excitantibus et omnino spirituosius nullam utilitatem ostenderunt, fortasse propterea, quod aut haec medicamenta volatilitate sua parvas corporis caloris reliquias magis minuunt, quam sustinent et augent, aut morbus nimie progressus est.

Huc pertinent inunctiones cum Oleo hyoscyami, lauroc. terebinth., junip., foenic., amygd. amar., cajeput, cinnam. aeth. cum Tinct. fuligin., liquor. guajac. succent., tinct. Kalina, tinct. camph., phosph. etc. cum unguento ammon. et aliis solitis unguentis. — Sinapismi (qui interdum liquore ammon. caust. acuti sunt) in suris, planta pedum, cruribus, spina dorsali, lumbis etc. — Cucurbitulae siccae in abdomine applicatae. — Vesicatoria vim suam lentius ostendunt, qua re aqua coquens et acida mineralia saepe praeferenda sunt. Post eorum autem effectum, vesicatorium in cordis regione, si ejus functiones lentissime procedunt, aut in abdomine, si vehementes dolores adsunt, aut in aliis e symptomatibus aptis locis simul adhiberi potest, et jam in maximo periculo tali modo utilitatem praebuit. — In eadem ratione acidum nitricum est efficax, quod Powell primus ad hoc consilium adhibuit, et Scott aliique commendarunt. Powell praecordia cum acido nitrico crudo (aqua forti) oblinchat, usque cutis rubescebatur, tunc hoc acidum cum aqua aut solutione Kali carbonici abluebatur.

In gravissimis et periculosissimis casibus etiam mox in spina dorsali et ferrum candens in abdo-

ne propositum est et interdum cum felici eventu
 in usum vocatum. E principio Hippocrati-
 (Aph. I. 6. ἐς τὰ ἔσχατα νοσήματα αἱ ἔσχαται
 παῖται ἐς ἀκριβείην κρατίσται) et Celsi (de
 lib. III. cap. XI, vehementi malo nisi aequa
 nemens auxilium succurrere non potest) haec
 media quidem non sunt rejicienda, sed etiam hoc
 auxilium magnopere est dubium.

Sanguinis detractio, hydrargyrum muriaticum
 et opium, balnea frictiones et rubefactientia
 sunt hucusque remedia prima contra choleram.
 Omnia alia in hunc morbum adhibita medicamenta
 ad eadem vel ad cetera symptomata referenda
 et latiori explicatione non carent, quum prin-
 cipia universae Therapiae hic satisfaciunt.

Nonnulla adhuc medicamenta igitur breviter
 pereram.

Propter sensibilitatem ventriculi et omnino
 malis alimentarii pleraque medicamenta interna
 bene feruntur et saepe evomuntur. Quam
 rem etiam difficile est judicatu, qua in forma
 media dentur et in quali dosi, ne ventriculo
 molestiae afferantur. Experientia autem docet,
 medicamenta in forma guttarum in plerisque ca-
 us cum bono effectu esse adhibita. Praecipue
 hac ratione liquores aetherei, tinct. valer. volat.,
 uor. Corn. Cerv. succ., tinct. mosch., tinct. camph.
 similia medicamenta ejusmodi laudantur. —

Apud maximam ventriculi sensibilitatem, ita ut omnia sumta mox evomantur, Blumenbach internum usum glaciei magnopere laudat, quae ei magnam utilitatem praebuit, ita ut postea appropinquante nausea semper mox glaciem adhiberet. Ipse autem glacie non ad sanationem uti voluit, sed potius ad suppressendam ventriculi sensibilitatem et ut eo facilius medicamenta interna indicata ferrentur. Vetuit usum glaciei apud pulsus fortiores, apud sudorem, qui symptomatum vehementiam mitigat, ne crisis interrumpatur.

Alij medici contra vomitus magna cum utilitate praecordia cum glacie lavari jusserunt, simulque epithemata frigida adhibuerunt. —

Si aegrotus nulla medicamenta fert et omnia evomit, tunc Wallace hanc mixturam: Rp. opii pur. gr. ii, Calom. gr. xv. mell. dr. j. m. f. mixt., in linguam inserit. Tali modo aegrotus cum utilitate sensim sensimque hanc mixturam, quae etiam in corpore manere solebat, deglutit.

Pertinacissimus est vomitus in hominibus, qui potuum spirituosorum usui dediti sunt. In his casibus Sokolow praescripsit gr. x Superearbonas sodae sive magnesiae simulque aquam menth. pip. cum succo citri vel aceto bibi jussit, et postea Calom. et opium dedit.

Contra vomitum etiam potio Riverii magna cum utilitate adhibita est, quae sicut in omni vomitu spastico bonum est medicamentum.

Tilesius utitur arniea mont., ubi pulsus nec plenus nec durus est, apud magnam ventriculi sen-

statem, praecipue apud siccam et calidam cutem, quidem infuso herb. et flor. arnic. mont. cum menth. pip., flor. chamom., samb., camph., opio, his acet., angelica, anis. stellat. cinnam, valer.

Si vomitus minuitur et cutis calida et humida tunc Milwood magnesia (scr. iv. p. d.) carbon. r., qua nullus vomitus oritur, sed bis aut ter deponitur.

Quum post primum medicamentorum usum vomitus omnino evanuit, tunc interdum canalem aliarium purgare commendatur, ad quem finem in medicamenta purgantia, Jalapp., rhab., scam., calom. a medicis Anglicis adhibita non laudantur, sed potius medicamenta leviter solventia quidem decoct. gramin. bard., tarax., sapon. additamento tartari stib., mitium Kalinorum. haec commendanda sunt (Elsner l. c.).

Jänichen credit: in magna nausea consilio sibi proposito ad vomitus inclinationem suspendendam, vomitum impediri (?) posse, attamen minus et tutius esse infusum concentratum coffeae. Item vomitus jam intravit, tunc acidum carb., vin., olea aetherea, aquam Kalinam frigidam aut calidam, sinapismos et vesicatoria in cordis scrobicula adhibuit.

Sicut in omnibus morbis ita etiam in cholera epidemica ad diarrhoeae, tenesmi, borborygmi suppressionem clysmata e principiis therapiacae universalis parata cum utilitate in usum vocata sunt.

Contra diarrhoeam et tenesimum Tilesius decoct. mucilaginosum Salep, seu decoct. orchid. cum aqua vel vino rubro, clysmata ex amylo parat. bonum jusculum commendavit; alii dec. salep cum syr. diacod. (praecipue contra diarrhoeam aquosam) clysmata ex amylo cum opio seu cum decoct. ratanb. parata. — Si excretiones biliosae apparent, tunc remedia solventia et purgantia per aliquod tempus adhibenda sunt (Annesley). Praecipue hoc tempore liq. Kali acet. indicatur, quo simul urinae secretio augetur.

Richter (Lichtenstädt II. 25. l. c.) usum extracti nucis vomicae contra diarrhoeam in posteriori morbi stadiis commendat.

Tilésius (l. c.) corticem cascar. optimum ventriculum roborans medicamentum, sublatis canalibus alimentarii sordibus acribus, et in similibus casibus quassiam, simarub. et rad. Colombo laudat et cum bono eventu in usum vocavit.

De siti vehemente tollenda non omnes medici consentiunt. Plerique decoct. aven., vel oryz., salep., hord. etc. omnino eos potus, qui in morbis inflammatoriis adhibentur, laudant; alii aquam cum aceto, aquam puram commendant; Milwood potui usitato spiritum nitri dulcem [fortasse contra urinae retractionem] addidit. — Simili modo medici dissentiunt, utrum potus esse debeat calidus aut tepidus aut frigidus. Experientia autem docet, potum antiphlogisticum mediocris temperaturae maxima utilitate fuisse.

Aegroto autem omnem potum negare non pro-
potest.

In nonnullis casibus bono effectum tartarus stib.
sum vocatus est et quidem apud prima morbi
symptomata utebantur granis viii; his sumptis vo-
mum et alvi dejectiones apparuisse, bilem evacua-
esse et paulo post convalescentiam intrasse
ant. Apud minorem morbi vehementiam gra-
iv, imo etiam gr. ii tantummodo utuntur. Et
mulieres gravidae hanc methodum bene tulerunt
postea liberos viventes pepererunt.

Si maturo tempore tartarus stib. adhibetur,
et spasmi non apparent neque raro convalescen-
celerrime sequitur (Conwell).

Conwell narrat, magnesiæ carbonicæ
rup. i — dr. i p. d.) in lacte recente sumtam
intervallis horæ dimidiæ usque ad horam integram
fuisse. Nescit autem utrum alia medica-
menta conjuncta fuerint.

James Boyle ipecacuanham, ut sanguinis
circulationem regularem restitueret simulque in-
tractus choledochos ageret, cum bono effectum
edit.

In iis casibus, ubi opium nullum [auxilium
æquebat, nonnulli acid. sulph. dilut in magnis do-
sibus aut acid. nitr. adhibuerunt.

Nonnulli, sicut priori tempore Sydenham
alii veteres medici, morbi initio dederunt jus-
sum magnopere tenue, e carne elixa et quidem
gallina paratum, quæ magna cum copia aquæ

est coquenda, ne jusculum nullum carnis saporem habeat. Quod jusculum aegroto largiter datur, etiamsi aegrotus continuo evomit. In clsymatis forma etiam jusculo usi sunt.

Prof. Dr. Henschel (l. c.) nonnulla in India a populo cum utilitate adhibita medicamenta refert et quidem haec: Infus. radic. dolichi prurientis, rad. Cyperi rotundi (ab Indiis Moot appellatus), fabam St. Ignatii conjuncta cum Coco maldivica (L.); horum medicamentorum utilitatem praecipue fabae St. Ignatii cum magna doctrina et sagacitate probat et commendat. Attamen major experientia de utilitate horum medicamentorum certius faciat.

Jänichen contendit, statum singularem typhosum, qui aegrotos absentibus jam cholerae symptomatibus in convalescentia interdum corripit, non semper ex opio aut aliis medicamentis excitantibus oriri posse, sed verosimiliter e priori conditione pathologica, in qua cerebrum, medullae spinalis cutes et systema sanguiferum fuissent. Ad impedienda symptomata typhosa applicationem frigoris (e capitis doloribus constituti) in capite, cutis incitamenta antagonistica proponit. Contrá prima symptomata acida mineralia, praecipue acid. Hall., cum utilitate adhibuit et in efformata conditione typhosa curam, ut in typho fieri solet, instituit, numquam autem remediis excitantibus usus est.

Alii autem e contrario, si cessante vomitu et diarrhoea aegrotus ad typhum, stuporem, delirium se inclinat, remedia excitantia et Chinam, serpen-

na, valer., contraj. cum aliis roborantibus, vobis et ventriculo aptis remediis laudant.

Thomas Hope hoc medicamentum magnolaudat: Rp. Acid. nitrosi dr. i, aquae menth. (seu mixt. Camph. Ph. Lond.) unc. i, tinct. gutt. xl. — Hujus mixturae quarta pars tri — quadrihorio dedit in patella tenuis de avenae; hoc vel aliud simile decoctum multum simulque ab aegroto continuo in valde parva bibitur. —

Novissimis temporibus Dr. Leo, Varsoviae, Bismuthi optimum medicamentum commendat, quod solummodo (e symptomatibus omnitrihorio gr. iii. p. d.) in pulveris forma cum charo simulque aliquantulum potus melissae cum bono eventu adhibuit. Cum hoc medicamento diu continuavit, usque nonnulla urinae secretio paruit. Si hoc autem acciderit, tunc per nonos adhuc dies pulverem unum mane et vespere dedit. Si lingua mucro flavo obtecta erat, huic veri cum magna utilitate radicem rhei tostam (iii p. d.) addidit. In hominibus valde plethoricis et juvenilibus sanguinis detractionem, partim caesatione, partim hirudinibus praemisit. Contra dolores vehementes in manibus pedibusqueunctiones mixturae calefactae e liquor. ammoniac. (unc. i) et spiritu angel. compos. (unc. vi) adhibuit. — Quaeritur autem, num ubique Bismuthum bism. hanc magnam utilitatem haberet, sed, choleram tum temporis Varsoviae benignum characterem habuisse, cognavi.

In universum ceteris in symptomatibus cura posthuma ex universis therapiae principiis instituitur, ideoque singularia et nova mihi non notanda sunt.

De Diaeta.

Decurrente morbo omne refrigerium omnesque fortes animi affectiones evitari debent. Victus semper facilis et non excitans observatur; quam ob rem cibus leviter digestivis uti debent: jusculis tenuibus vitulinis, ex avibus, pane albo, hordeo, avena, sago et aliis ejusmodi paratis. — De potu jam supra sermo fuit. — Domicilium et aer bonum esse oportet. — In convalescentia victus aliquantulum roborantior esse potest, et famines, qui semper hoc tempore permagna est, non mox satiari licet, sed frequenter quidem cibus levibus semper vero parce uti possunt. — Omnia cetera cum diaeta post alios morbos graves conveniunt.

De regimine.

Contra choleram nos tueri possumus, si omnes causae jam supra commemoratae et praedisponentes et occasionales, quantum fieri potest, evitantur; nam omnia, quae directe vel indirecte organismum debilitant, quaecunque vires vitales imminuunt, excessus igitur omnis generis, ad choleram disponunt. Si nonnullae causae morbi, (exempli gratia aeris et anni temporum mutationes) non evitari possunt, tunc contra earum vim organismus defendatur et confirmetur medicamentis tonicis, quae in cutem agunt, functiones organorum digestionis augent et conservant, nec autem vinis et spirituosius, quorum vis excitans celerius organismum relinquit et tunc eo magis eum ad choleram disponunt. Praeter omnia autem societas et consuetudo et commercium

hominibus, qui aut cholera laborant aut in
 in quo aegrotorum habitant, omnino evitari de-
 quam ob rem superiorum magistratuum om-
 na hac ratione instituta, magnopere salutaria
 manda nec autem negligenda sed potius quam
 am sustinenda sunt.

Quomodo cholera apparet?

ter omnes constat, choleram et sporadicam et ende-
 et epidemice, e variis causis, quae eam efficiunt,
 rere. Attamen plerique medici tantummodo cho-
 m sporadicam et choleram epidemicam discer-
 , dum choleram endemicam omnino omittunt.
 frequentissime cholera in terris tropicis, praë-
 e; autem in Asia Australi et quidem in India
 ntali et occidentali apparet. Ibi plerumque
 sibus calidis saepe jam magna cum saevitia
 mice et epidemice regnavit et in posterum
 abit. — Praecipue aestate, minus verò per
 umnum et nunquam hiberno tempore in his
 is grassari solet.

In Europa saepius in partibus australibus,
 n septentrionalibus, praecipue tempore aestatis
 uidem mensibus Julio et Augusto plerumque
 radice, sed etiam epidemice, sicut Sydenham
) narrat, se manifestavit.

Experientia hucusque docuit, choleram instante
 ne non modo multo mitiorem fieri sed etiam
 pore hiberno semper evanescere solere. Atta-
 historia praesentis cholerae epidemicae de-
 strat, hunc morbum etiam hiemi resistere posse.
 Haec cholera epidemica omnia hominum ge-
 aggreditur, nullo temperamento, nulli aetati
 cit; attamen secundum experientiam liberi et
 s juvenilis magis quam ii provectae aetatis,
 saepius ac feminae et homines alieni magis
 m incolae cholerae expositi sunt. — Hic mor-

bus ab aeris temperatura non dependebat, nam anni omnibus temporibus regnavit; non solum in locis humidis et profundis sed etiam in regionibus montuosis (exempli causa Nepaul) et aridis erupit denique ventus eum non diffuderunt, quum saepe aliter quam ventus vertebatur.

OBSERVATIONES APUD CADAVERUM SECTIONEM PATHOLOGICAE.

I. Corporis forma externa.

Faciei vultus collapsi et hippocratici; labia et aliae ab epidermide non tectae partes subpurpurei coloris; oculi reconditi; vasa superficilia contracta et sanguine vacua aut fere vacua; extremitates corrugatae et contractae et coerulei coloris; suffusiones in iis locis, in quibus aegrotus durante morbo jacuit; magna musculorum totius corporis rigiditas.

II. Capitis cavum.

Si calva tollitur sanguis e durae matris vasibus effluens viscidus est et coloris brunnei; dura mater autem est niger vel subpurpurea. Si haec cutis tollitur, tunc vasa trans cerebrum currentia omnino tumescentia, quasi cum fusco, purpureo liquore injecta reperta sunt (Conwell). Arachnoidea saepe vel potius plerumque non pellucida, aliquantulum densata et vicinas cutes adhaerens. Cerebri substantia mollis et pulti similis ejusque omnes sinus et venae cum nigro, crasso, viscido sanguine magnopere completa (Scott, Keraudren, Labrousse). In ventriculis et inter cutes saepe aliquantulum serosum aut gelatinosum extravasatum. — In columna vertebrali exsudatio sanguinosae lymphae, vasorum sanguiferorum magna congestio praecipue circa caudam equinam, substantia medullae spinalis subruher et mollis frequenter observabatur. —

III. Pectoris cavum.

Cor et magni venarum trunci plerumque á crasso, po sanguine intenzi, qui sanguis interdum fluidus semifluidus, aut et plerumque coagulatus et tunc tinae similis erat. Ventriculus dexter plerum- ab eodem sanguine completus, interdum sed etiam ventriculus sinister. Cordis substantia lior et facilius lacerari poterat.

Pulmones minuti, collapsi, plus minusve lan- li, cum nigro sanguine completi, interdum gra- tes, carnosiores et hepatisati (Keraudren, mesley); superficies eorum posterior nigro- tui et nigri coloris (Cowell). — Pleura pallida ana. — Pericardium normale interdum aliquan- m serum continens.

IV. Abdominis cavum.

Apud aperiendum odor singularis injucundus, cipue in celeriter mortuis (Annesley, Jame-). Ventriculus continuit modo majorem, o minorem, aquosum, turbidum, interdum gle- um liquorem, qui sine colore aut subflavus raneus, aut fere niger fuit. Cutis ventriculi pe- naealis solummodo majorem congestionem in ve- ostendit. Cutis ejus mucosa interdum cum tur- , colorato, viscido muco tecta, et hoc sublató e in vasibus capillaribus magna congestio, quae cipue in tela cellulosa sub cute mucosa esse vi- atur, animadversa est (Annesley, Conwell, sper). — Cutis ventriculi interna valde cor- ata, aliquantulum densior et viscidus, praecipue m ventriculus aut liquore, aut aere non magno- e extensus fuit. — In nonnullis casibus super- s interna praecipue in regione pylori fere pur- ei coloris fuit. — Saepe ventriculus languidus, s et cutes ejus facilius lacerabiles erant.

Omentum interdum complicatum vel potius corrugatum, aut in unum abdominis latus aut in alterum immissum; in ceteris autem normale erat.

Intestina tenuia interdum in nonnullis locis contracta, saepe flatibus extensa, eorum venae sanguine nigro magnopere impleta, in externo latere densa, pani lento similia, a pallide rubro colore ad fusce purpureum colorem transgredientia, et duodeni quidem et jejuni tegumentum pallide rubrum erat; ileum autem eo loco, quo cum coeco conjungitur, purpurei coloris. — Hic colorum transitus a congestionis gradu et sanguinis colore dependebant. — Cutis internae intestinorum horum densiores erant, praecipue si intestina non fuerunt intensa sed contracta. Praeterea cutis interna fuit tecta cum viscida, tenace massa, luti coloris, flori lactis similis, subfusca praecipue apud morbum subito et celeriter finitum. Amota hac massa cutis mucosa in superiori intestinorum tenuium parte plerumque pallidi coloris reperta est, in inferiori autem parte fusci coloris, congestionem ostendente, praecipue tunc, si ileum in externo latere coerulei vel purpurei coloris fuit. — Si morbus per longius tempus duravit et praecipue si vis reagens apparuit; tum haec massa viscida plus minusve disjuncta erat et in contentis intestinorum tenuium et crassorum navavit. Cutis mucosa in his casibus uberior erat vasibus et vasa arteriosa capillaria magis injecta, quam in superiori casuum classe videbantur.

Intestina crassa frequenter contracta, interdum extensa nonnumquam utrumque simul in variis locis erant. Congestio in eorum venas et venosa capillaria vasa manifesta praecipue etiam in tela cellulosa. Cutis externa fusci coloris propter sanguinem. — Cutis mucosa vasibus copiosa, interdum purpurei coloris, praecipue apud longum

bum et fortia stimulantia medicamenta. Nullas res continuerunt sed liquorem ei ventriculi et huiusmodi intestinorum similem. — Vasorum constrictio tenuium intestinorum symptomata in regione umbilicali partim explicant.

Ductus thoracicus frequenter nullum lumen continuit (Hasper).

Hepar magnopere fuscii coloris, cum nigro et foetido sanguine completum, interdum purpurei aut cerulei, aut maculosi coloris, majus, laxum et viscido simile, faciliter lacerabile. Conwell nunquam hepatis vasa lacerata et multum sanguinem in externam curvatam hepatis superficiem effusum vidit. —

Vesica fellea semper fere completa cum massa, tenace, viscida bile. Bilis plerumque in tenuis, priusquam durante morbo in excretionem animadversa est, subviridem aut nigrum colorem habuit. Quamquam ductus hepaticus latus et longus fuit, attamen ostium ductus choledochi contractum esse solebat, ita ut plerumque bilis postea in vesicam felleam digitorum pressum intraret. — Post vitalium virium reactionem et transfusionem in intestina vesica fellea fuit vacua, interdum autem paucam sanam bilem continebat, ductus choledochus tunc aliquantulum contractus repertus est, attamen non tam angustus sicut in superiori casu. In casibus paucis vesica fellea omnino vacua, laxa et languida est reperta.

In omnibus fere casibus, ubi bilis in excretionem et in sectione vesica fellea vacua erat observata, illa massa viscida, cum qua superficies tenuium intestinorum fuit tecta, plus minusve disjuncta erat et aut in contentis liquidis intestinorum crassum navavit, aut jam alvi dejectionibus sublata erat.

Splen plerumque major, cum nigro sanguine magnopere completus (quod Conwell non observavit) texturae mollis, coloris fuscii.

Renes plerumque normales, interdum autem minus crassi et languidi (Conwell).

Vesica urinaria plerumque vacua, retracta saepe sub ossa pubis, cutis ejus mucosa frequenter cum multo viscido muco tecta. — Contractio vesicae urinariae verosimiliter etiam e carente urina orta fuit. —

CURRICULUM VITAE.

Ego Mauritius Schlesinger natus sum Vratislaviae anno 1806 parentibus optimis Jos. Schlesinger, quem praematura morte defunctum lugeo, matreque Beate e gente Cantoriana. Literarum primis rudimentis ab ornatissimo viro Sebastiano Pauly praeceptore optimo et de me magnopere merito imbutus, petii anno 1818 gymnasium Fridericianum - Guilelmicum, duce beat. V. Ill. Kaysler et V. H. Hanegiesser, quem utrumque praeceptorem semper grato animo veneror. Testimonio maturitatis instructus hanc aliam litterarum sedem sum aggressus et die XIV. m. Aprilis a. 1826 ab Ill. Weber, t. t. Rectore Magnifico, inter cives academicos receptus et apud Ill. Otto t. t., et praesente quoque tempore, medicorum ordinis gratiosi Decanum maxime Spectabilem medicinae studiosis adscriptus sum. Quo ex tempore hisce scholis interfui;

Ill. Steffens, de elementis physicae experimentalis et hodigetice. — Ill. Wachler de historia litterarum recentioris aevi. — Celeb. Branis, de logica et philosophia Fichtiana. — Celeb. Glocker de oryctognosi et crystallographia. — Ill. Treviranus, de botanices elementis, physiologia plantarum nec non eum ducein habui in excursionibus botanicis. — Ill. Purkinje de physiologia et

ologia. — Ill. Otto, de zoologia, anatomia tum
 ica quam practica, anatome comparativa et patholo-
 de osteologia et syndesmologia et de historia foetus
 .. — Ill. Wendt, de aquis medicatis in Germania
 de materia medica, de febribus, inflammationibus,
 e laesa nutritione oriundis nec non de exanthemati-
 Ill. Benedict, de chirurgia universali et speciali
 natalmiatrica, nec non examinatoriis de his disciplinis
 is, de instrumentis chirurgicis et fasciis rite applican-
 operationibus in cadavere institutis interfui. Clinico
 gico per biennium eo duce benevolentissimo usus
 — Ill. Remer de Therapia speciali universa pyrexia-
 t apyrexiarum, de arte formulas medicas rite concin-
 de medicina forensi docentem me audivisse glori-
 virum clarissimum ducem optimum et moderatorem
 uissimum per biennium me habuisse in clinico medico
 rataque mente, dum vivam, memor ero. — Celeb.
 schel, de encyclopaedia medica, de historia medicinae,
 xu plantarum et de botanica practica. — Celeb.
 tenstädt, de arte formulas medicas rite concinnandi.
 celeb. Betschler, de arte obstetricia cum theoretica
 practica; operationibus quoque in cadavere institutis
 ui. In clinico et polielinico obstetricio per annum in-
 m magna cum benignitate, humanitate et patientia dux
 us mihi fuit et non solum a me, sed profecto etiam ab
 ous suis discipulis maxime veneratur et amatur. — Ce-
 Berig operationibus in cadavere institutis interfui. —
 Barkow, de osteologia syndesmologia et angiolo-
 — Exp. Seidel. de medicamentis anorganicis, de
 nismo et magnetismo. — Exp. Remer, de syphilide.
 p. Hemprich, de pathologia et de temperamentis.

Quibus omnibus Viris Illustrissimis, Celeberrimis et
 rientissimis, praeceptoribus optime de me meritis, ma-
 s, quas habeo, gratias ago semperque agam. Nullo
 ecto tempore, dum vivo, memoria beneficiorum singu-
 um in me collatorum ex animo meo discedet.

Tentamine philosophico et medico nec non
 rigoroso rite superatis, spero fore ut conscripta de
 dissertatione inaugurali, summi in medicina et chiru-
 nores mihi deferantur. —

E R R A T A.

- P. 2. liu. 25. pro diseases lege diseases.
 - 6. lin. 21. pro dissertas lege dissert.
 - 7. lin. 6. pro Lod lege Lond.
 - 8. lin. 7. pro Car lege Cor.
 - 8. lin. 30. pro morgenländische lege morgenländische.
 - 10. lin. 27. pro Transastions lege Transactions.
 - 11. lin. 25. pro SCHUBRT lege SCUBERT.
 - 13. lin. 1. pro CHOLETA lege CHOLERAÆ.
 - 13. lin. 8. pro nio lege nino.
 - 16. lin. 22. pro diuntur lege ditur.
 - 20. lin. 23. pro laborantss lege laborantes.
 - 20. lin. 28. pro aus lege aut.
 - 22. lin. 6. pro . lege ?
 - 22. lin. 20. pro miasmaticam lege miasmaticum.
 - 23. lin. 18. pro causa lege causa.
 - 24. lin. 1. pro doeed lege doect.
 - 24. lin. 5. pro. corunta lege cornuta.
 - 24. lin. 9. pre judicatum lege judicatu.
 - 26. lin. 29. pro creti lege cretio.
 - 31. lin. 15. pro spastica lege spastica.
 - 31. lin. 19. pro fellem lege fellea.
 - 33. lin. 18. pro mon lege mox.
 - 35. lin. 9. pro studia lege stadia.
 - 53. lin. 21. pro effiice lege effice.
 - 58. lin. 10. pro egitur lege tegitur.
 - 61. lin. 16. pro antecholericum lege anticholericum.
 - 69. lin. 31. pro cognavi lege cognovi.
 - 71. lin. 10. pro Attamenp lerique lege Attamen ple
-